









Ed. L. Peironc.









S Y N O P S I S
NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

E X H I B E N S

C L A R I S S . V I R O R U M

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, ET SAGARI,
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

E D I D I T

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

A D J E C I T

G U L I E L M U S C U L L E N ,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.
MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,
ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS;
NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. PHILOS. EDINB.
PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.
MED. HAUNIENS. ET MED. EDINB.
SODALIS.

E D I T I O T E R T I A ,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA ,

D U O B U S T O M I S .

T O M . I.

E D I N B U R G I :

Prostant venales, apud GULIELMUM CREECH ;
et LONDINI, apud THOMAM CADELL,
et JOANNEM MURRAY, Bibliopolas.

M,DCC,LXXX.

Frankland, James

8.A.203



L E C T O R I
S.

PRODIT jam tertia vice multum, ni
nos fallunt amici, expetita Synopsis
haec nosologiae methodicae. Quam, ut
expectationi eruditorum pro virili satisface-
rem, plurimum auctam, ubique emenda-
tam, et usibus, ut spero, medicorum ac-
commodatiorem, exhibui.

UT omnia fere, ad rem nosologicam
spectantia jam edita, sub uno conspectu
hic ponerem, ex systemate symptomatico
Clar. MICH. SAGARI, Anno 1776 Viennae
edito, quae ad genera morborum definienda
pertinent excerpta, hic primum addidi.

QUÆ porro in re nosologica ipse co-
natus sum, emendatoria, et adeo amplio-
ra, dedi, ut opus fere prorsus novum vi-
deatur. Generum characteres omnes, ple-
niiores atque accuratiores reddidi; et Spe-
cies eo, quo mihi recte dari viderentur,
numero, sub appellationibus tum characte-
risticis,

risticis, tum *trivialibus*, ut vocant, quas ipse maxime idoneas putaverim, nunc recensui: Additis tamen adhuc speciebus fere omnibus a SAUVAGESIO recensitis.

QUÆ denique ulterius hic dicenda essent, in Prolegomenis, initio tomi hujus operis alterius praefixis, inveniri possunt; atque illuc Lectorem ablegamus.]

P A R S P R I M A.

G E N E R A
M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2 tom. 4to.

Amstel. 1768.

S E R I E S

C L A S S I U M E T O R D I N U M.

C L A S S I S I. V I T I A.

O R D O I. M A C U L Æ.

- O. II. E F F L O R E S C E N T I Æ.
- O. III. P H Y M A T A.
- O. IV. E X C R E S C E N T I Æ.
- O. V. C Y S T I D E S.
- O. VI. E C T O P I Æ.
- O. VII. P L A G Æ.

C L. II. F E B R E S.

- O. I. C O N T I N U Æ.
- O. II. R E M I T T E N T E S.
- O. III. I N T E R M I T T E N T E S.

CL. III. PHLEGMASIAE.

- O. I. EXANTHEMATICÆ.
- O. II. MEMBRANACEÆ.
- O. III. PARENCHYMATOSÆ.

CL. IV. SPASMI.

- O. I. TONICI PARTIALES.
- O. II. TONICI GENERALES.
- O. III. CLONICI PARTIALES.
- O. IV. CLONICI GENERALES.

CL. V. ANHELATIONES.

- O. I. SPASMODICÆ.
- O. II. OPPRESSIVÆ.

CL. VI. DEBILITATES.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- O. II. ANEPITHYMIÆ.
- O. III. DYSCINESIÆ.
- O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.
- O. V. COMATA.

CL. VII. D O L O R E S.

- O. I. V A G I.
- O. II. DOLORES CAPITIS.
- O. III. D^r LORES PECTORIS.
- O. IV. DOLORES ABDOMINA-
LES INTERNI.
- O. V. DOLORES EXTERNI ET
ARTUUM.

CL. VIII. V E S A N I Æ.

- O. I. HALLUCINATIONES.
- O. II. MOROSITATES.
- O. III. DELIRIA.
- O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CL. IX. F L U X U S.

- O. I. SANGUIFLUXUS.
- O. II. ALVIFLUXUS.
 - 1. *Sanguinolenti.*
 - 2. *Non Sanguinolenti.*
- O. III. SERIFLUXUS.
- O. IV. AERIFLUXUS.

CL. X. C A C H E X I Æ.

- O. I. MACIES.
- O. II. INTUMESCENTIÆ.
- O. III. HYDROPS PARTIALES.
- O. IV. TUBERA.
- O. V. IMPETIGINES.
- O. VI. ICTERITIÆ.
- O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

G E N E R A
M O R B O R U M
MAY - 7 1920
C L A S S I S I . V I T I A .
LIBRARY

CHARACTER. Symptomata cutanea levidensia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

O R D O I . M A C U L Æ .

C o l o r i s n a t i v i m u t a t i o n e s .

G E N U S I . L E U C O M A .

M a c u l a o p a c a n s c o r n e a m .

G . I I . V I T I L I G O .

M a c u l a c o r y m b o s a , s e u e x m i n o r i b u s m a c u l i s c o m p o s i t a , c u m d e p r e s s i o n e c u t i s .

G . I I I . E P H E L I S .

M a c u l a e a c q u i s i t a e , u m b r i n a e , g l a b r a e , c o r y m b o s a e , f a c i e m v e l t i b i a s , r a r i u s p a r t e s t e c t a s , a f f i c i e n t e s .

8 GENERA MORBORUM

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua matér initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cunctis elevatio per pustulas, papulas, phlyctenæ, varos, similesve asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice rupturn.

b. Papula. Phyma parvulum desquamari solutum.

c. Phlyctaena. Vesicula fluido seroso plena.

d. Varus. Tuberculum durum constans.

G. VII. HERPES.

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas surfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum affidentes, et noctu potissimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRA CLA.

Phymata erysipelatosa.

G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

G. XI. ERYTHEMA.

Tumor sine febre, superficiarius, solitarius, diffusus, rubro roseus, pressione evanescens.

10 GENERA MORBORUM

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor spheroideus, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinialis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor scirrho-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cuius centrum, cum

S A U V A G E S. II

Suppuratus est, occupant fibrae crassae, quae
in pus non colliquescunt.

G. XIX. ANTHRAX.

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflam-
matum.

19

G. XX. CANCER.

20

Tumor durus, tuberosus, lacinans, pertina-
cissimus.

G. XXI. PARONYCHIA.

21

Phlegmone extreimi digiti cum dolore perte-
rebrante.

G. XXII. PHIMOSIS.

22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi
vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente
crescentes, in suppurationem sponte non
abeuntes.

G. XXIII. SARCOMA.

23

Excrecentia carnis consistentiam circiter ob-
tinens.

12 GENERA MORBORUM

- 24 G. XXIV. CONDYLOMA.
Excrescentia firma carnibus durior, ossibus
mollior.
- 25 G. XXV. VERRUCA.
Excrescentia cutanea prominens, condyloma-
te minor, sensu destituta, indolens.
- 26 G. XXVI. PTERYGIUM.
Excrescentia carne, vel membranaceo-vas-
culosa ad oculi canthum exorta, aliam ex-
pansam referens, et versus corneam se ex-
tendens.
- 27 G. XXVII. HORDEOLUM.
Tumor durus vix sensu gaudens, cuti con-
color, raro rubens, in palpebrarum limbo
enascens, sphaericus, piso ut plurimum mi-
nor.
- 28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.
Excrescentia vel tumor scirrhosus anticae par-
tis colli.
- 29 G. XXIX. EXOSTOSIS.
Tumor ossis vel totalis vel partialis.
- 30 G. XXX. GIBBOSITAS.
Ossium pectoris indecora prominentia a tu-

more, luxatione, distortione, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. L O R D O S I S. 31

Ossium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. C Y S T I D E S.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

G. XXXII. A N E U R I S M A. 32

Cystis arteriosa.

G. XXXIII. V A R I X. 33

Cystis venosa.

G. XXXIV. H Y D A T I S. 34

Cystis lymphaedictuum.

G. XXXV. M A R I S C A. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruentum saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

14 GENERA MORBORUM

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cystis vel folliculus meteriem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHROS.

Cystis articuli aquosa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cystis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis saepius aquosa,

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cystis in scroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoes, Celes, Pararthremata, *Græc.*

Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh. de Morb.*

Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, *Ecpiesmus Graecorum.*

Mauchart, diss. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter Haller. disput. Chir. I. I.

Grosseur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chute de Poeil. *Maitre-Jan, part. II. chap. 6.; Saint Yves, Part. II. chap. 1.*

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibiliter nativa ipsius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* 43

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec intversion des tarses.

Vide *Platner. Instit. Chirurg. § 577. § 584.; Maitre-Jan, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; Saint Yves, part. I. chap. 8. 9. 10.; Dionis, Dem. 6.; Boerh. de Morb. ocul. part. I. cap. 5.; Heister. Chir. T. I. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48.; Gorter. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.*

16 GENERA MORBORUM

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae,
retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*, Chir. T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralysis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSÉ.

Linguae extumescentia, magnitudo, inflatio, *Galen*. Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon, lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat. Med. Histor.* mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio exertio, *Gorteri*.

Glossocele *Gaubii Pathol.* § 242.; Linguae extrusio, Idem, § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit. Mem.* de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

lutaë vel ore extrusæ, exundantis, exertae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA.

46

Partis externæ, etiam ante lapsum conspicuæ, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversæ procidentia.

G. XLVII. EXANIA.

47

Proctocele Pathol. Meth. edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obs. sur les polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE.

48

Prolapsus, inversio vesicae urinariae *Auctorum*; *Salzmanni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* Disp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. *Noel*. obs; Recherches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius

18 GENERA MORBORUM

collum, interne obvestientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heisteri Inst. chir.* tom. II.; *Gunzii de Herniis*, &c.

Relachement, chute, descente, renversement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. I. chap. 24. &c.; *Puzos* sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia intestini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE. *Ign. la Chausse.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani resp. ad Doring.* pag. 915.; *Blegney Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs. 2.* pag. 44.; *Gunzii libell. de hern. cap. 20. Ign. La Chausse Diff. de hernia ventrali, et Kirschbaum Diff. de hern. ventriculi in disp. Chir. Haller. tom. 3. Diff. 68. 69.*

Hernie de l'estomac, *La Faye sur Dionis*, pag. 121.; *Arnaud Tr. des hernies*, preface, p. 81.; *Sharp Rech.*

Crit. chap. I.; *Garengœut*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. I. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* Li- 53
bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I Ann. II. et Dec. II.
Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud des hern.* tom. I.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Li- 54
bell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epist. LV. pag. 999.; *Spi-gelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyschii* Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Rate, *Arnaud des hern.* tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

20 GENERA MORBORUM

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. 4. Med. Pract. part. II. sect. II. cap. 17.; *Doringii Epist.* ad. G. Fabr. *Hildanum de hernia uterina*, p. 893.; *Graaf.* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyssch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud des hernies.* T. I. pag. 29.; *Sabatier Mem.* de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner.* Inst. Chir. *Ign. La Chausse de hern.* ventrali.

Hernia cystica quorundam.

Hernia vesicae urinariae *Salzmanni Diff.* inter *Halleri Disp.* Chir. T. III. Diff. 72.; *Gunzii Libell.* de Hern. &c.

Hernie de la vessie urinaire *Mery.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot Oper.* de Chir.; *Levret Obs.* sur les polypes; *Sharp Rech. Crit.*; *Verdier Mem.* de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguinales, sub arcibus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginalis parietes elapsae ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* 57

Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp.

Chir. T. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiselii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II.

Obs. 115.; *Lechelii* ibid. Obs. 158.; *Treu Comm. Litt.*
1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano mon-
stro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo En-
cephali, per ossum cranii non penitus ossi-
ficatorum hiatum prorumpentis, ectopia
herniosa.

G. LVIII. HYSTEROXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. § 449.
—507.; *Levret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap.
46. 47. 48.; *Ruysschii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier*, Mem. de
l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravi, et contra quam in
hysterocele sit, abdominis claustris conten-
ti situs in obliquum errans.

G. LIX. PARORCHIDIUM. 59

Testiculorum senior descensus, vel retractio, *Felic. Pla-*
teri Mantiss. Observ.; *Ambr. Paraei* Lib. vii.; *Thom.*

22 GENERA MORBORUM

Bartholini Hist. Anat.; *Morgagni Advers. IV.*; *Denis Oper. de Chir. Dem. IV.*; *Quelmatzii inter Halleri Disput. Anatom. T. V. Dissert. I.*; *Verdier sur la Hernie de la Vesie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.*

Testiculi unius, vel utriusque, cuius post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, Graec.

Exarthrosis, Parathrema eorund.

Luxatio, subluxatio, distortio, Heister. Inst. Chir. T. I.; *Boerh. Aph. comment. T. I.*; *Gorter. Chir. repurgat. cap. VI. Platner. Institut. Chir. § 1090—1213.*

Luxation, entorse, Petit Malad. des os, T. II.; *Coll de Villars Chir. T. V.*; *de la Faye Princ. de Chir.*; *Duverney Malad. des Os, tom. II.*

Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, Graecorum.

Ossium recessus, Latin.; *Petit T. II. chap. 8. et 13.*; *La Faye Princ. de Chir. pag. 474.* *Duverney T. II. ch. 1. et 5.*

Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHROUS.

Perversio capitis ossium ac muscularum appensorum,
Duverney, T. II. cap. II.

Artis vari *Duverney, T. II. cap. II.*

Gibbositas scapularis *Auctorum.*

Ossium cum motu sensibili articulatorum si-
 tus relativus in alienum constanter muta-
 tus, aut obliquitas respectiva persistens ci-
 tra exarthrema et spasmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum
 labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad in-
 flammationem suppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui solutio intus tantum extensa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulae vel cutis a carnibus subjectis se-
 paratio.

24 GENERA MORBORUM

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnosí, potissimum infra cutem, rup-
tio per minima puncta et vasorum con-
tritio, ecchymoma saepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica ossis in frag-
menta invicem non cohaerentia.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio ossis in duas partes rima tantum
dissitas, et alterutro saltem extremo co-
haerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilagi-
num solutio, vel vehemens distractio, cum
vel sine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA. *Ill. Linn.*

G. 241.

Solutio continui in partibus tum molibus,
tum osseis, cum artus, articuli, vel partis
totali separatione a residuo truncō.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium erosio purulenta, cute pro-
fundior, cum pure ichorofo vel utcum-
que vitioso.

| | |
|---|----|
| G. LXXII. EXULCERATIO. | 72 |
| Excoriatio ulcerosa suppurans. | |
| G: LXXIII. SINUS. | 73 |
| Cavitas ulcerosa, cuius fundus amplus, saepe multiplex desinit in angustum orificium. | |
| G. LXXIV. FISTULA. | 74 |
| Cavitas ulcerosa, sinuosa, cuius parietes callo- si sunt ut plurimum, aut fundus ad os cari- osum, arthrocace corruptum, pertingit. | |
| G. LXXV. RHAGAS. | 75 |
| Solutio continui sicca in partium marginibus. | |
| G. LXXVI. ESCHARA. | 76 |
| Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corpo- ris humani coagmentata. | |
| G. LXXVII. CARIES | 77 |
| Ossis suo periosteo denudati decoloratio, a- speritas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio. | |
| G. LXXVIII. ARTHROCACE. | 78 |
| Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysi- bus, cum carie, exostosi, et dolore. | |

CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret exspectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perfeverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

G. III. SYNOCHUS *Galeni.*

81

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de 82
intern. affect. Foesii 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime prostratis.

G. V. HECTICA *Galeni* et ejus Sequa- 83
cium; *Sydenhami*, p. 524.

Decursus ultra mensem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulsu post pastum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit, non omnino recedit, typus saepe confusus.

28 GENERA MORBORUM

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remissio quotidiana typum servat. Exacerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia plures in decursu aegritudinis defert et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidentur.

88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ *Galeni.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna
inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius ma-
ligna, quandoque lenta.

G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia ty-
phodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Jou- 92
berti, et antiquorum.*

Eruptio pustularum phlegmonodearum in
suppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter
magnitudine sero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus no- 94
minata a traductoribus *Haly Abbatis Practi-
cae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae
Medela.*

30 GENERA MORBORUM

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas
abeuntium. Praecedunt tussis sicca, ster-
nutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii semini non ma-
jorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra,
indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum synocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa,
lata, parum uniformis, in squamulas fur-
furaceas abiens, sed sine praeludio catar-
rhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem
se prodens ac recondens vicissim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipe-
latosa, subito accedens per vices et rece-
dens.

G. X. APHTHA. 100

Eruptio pustulosa, phlyctenodes, et ulcerosa,
in ore aut pudendis.

O. II. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo synochae vel synochi
cum dolore visceris cujusdam.

G. XI. PHRENITIS. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum,
pulsusque major, pyrexia acuta.

G. XII. PARAPHRENESIS. 102

Symptomata phrenitidis et peripneumoni-
ae.

G. XIII. PLEURITIS. 103

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens,
tuffis.

G. XIV. GASTRITIS. 104

Dolor epigastrii, nausea, vomituritio, febris
typhodes, vel remittens maligna.

G. XV. ENTERITIS. 105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

32 GENERA MORBORUM

teorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum juxta epiploi extensionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extensione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dysuria vel ischuriaz.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non sacciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio somnolento, et cataphlogia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta.

G. XXI. CARDITIS. 111

Dolor sub sterno, pulsus inaequalis, frequens,
palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravatus
pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mol-
lis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni I. Epid.* 113

Comm. 3.

Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum
pondere, tussi sicca, respiratione diffcili.

G. XXIV. SPLENI TIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix
tolerans, cum febre ut plurimum remit-
tente.

G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta urete-
res in vesicam directus, cum febre acuta,
dysuria, ischuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata,
muscularum organis locomotivus, non vi-
talibus inservientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi de-
terminati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergenti-
am inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clo-
nicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mo-
bilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, con-
stans, diuturna, rigiditas sensim exorta.

G. V. C R A M P U S. 120

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

G. VI. P R I A P I S M U S. 121

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII. T E T A N U S. 122

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

G. VIII. C A T O C H U S. 123

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cuiusdam organi, vel artus, cuius motivum non percipitur.

G. IX. N Y S T A G M U S. 124

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. C A R P H O L O G I A. 125

Motus velut convulsivus manuum, quo ae-

36 GENERA MORBORUM

gri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

127 G. XII APOMYTTOSIS.

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et superstite in paroxysmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.

G. XVI. CLAUDICATIO.

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibiliter, dextrorum vel sinistrorum transfertur.

131

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

G. XVII. RIGOR.

132

Totius cutis succussio frigorifera.

G. XVIII. ECLAMPSIA.

133

Artuum vel muscularum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

G. XIX. EPILEPSIA.

134

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

G. XX. HYSTERIA.

135

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculturum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmadicorum motuum pectoris cum exspiratio-
ne sonora.

G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio
terrifico. 138

G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum exspiratione
veloci narium interiora everrente et sonora. 139

G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiante,
saepius cum pandiculatione. 140

G. IV. SINGULTUS.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione su-
bito interrupta, sonora. 141

40 GENERA MORBORUM

142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmónem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendingi, sine metu suffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

144 G. VII. DYSPNOEA.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empymatis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNOEA.

Praecepit ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

G. X. ANGINA.

147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficulti, sine phlegmasia.

G. XI. PLEURODYNE.

148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

G. XII. RHEUMA.

149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX.

150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA.

151

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sapore.

152 G. I. CATARACTA.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

S A U V A G E S. 43

- G. V. ANOSMIA. 156
Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.
- G. VI. AGHEUSTIA. 157
Gustus debilitas aut gustandi impotentia.
- G. VII. DYSEÇÆA. 158
Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.
- G. VIII. PARACUSIS. 159
Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.
- G. IX. COPHOSIS. 160
Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.
- G. X. ANÆSTHESIA. 161
Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.
- O. II. ANEPITHYMIÆ.
Appetitum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

44 GENERA MORBORUM

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis
feriatio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis
feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppres-
sio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac saepe sensus in organis
libertati subditis, ut lingua, larynge, artu-
bus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi potentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et
syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi im-
potentia.

| | | |
|-----------|---|-----|
| G. XVII. | PARAPHONIA. | 168 |
| | Vocem solitam edendi impotentia. | |
| G. XVIII. | PARALYSIS. | 169 |
| | Motus aut tactus, vel utriusque in uno tan- tum artu debilitas. | |
| G. XIX. | HEMIPLEGIA. | 170 |
| | Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere. | |
| G. XX. | PARAPLEXIA. | 171 |
| | Debilitas sensus et motus in dimidio corpo- ris transversim sumpti. | |

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

| | | |
|---------|--|-----|
| G. XXI. | ASTHENIA. | 172 |
| | Totius corporis gradaria seu successiva debi- litas, sensibus integris. | |

| | | |
|----------|--|-----|
| G. XXII. | LEIPOTHYMYIA. | 173 |
| | Virium muscularium totius corporis subita- nea imminutio, pulsu superstite. | |

46 GENERA MORBORUM

174 G. XXIII. SYNCOPĒ.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et sensuum apparens cef-satio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phan-tasiae, memoriaeque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporosus cum artuum flexilitate et ad quosvis novos situs retinendos aptitu-dine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporosus a gravi pathemate subito or-tus, aegrū in eodem sitū quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel so-por levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS.

179

Status soporosus facile excitabilis cum summo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPOLEPSIA.

180

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione.

G. XXX. CARUS.

181

Sopor profundus sine stertore.

G. XXXI. APOLLEPSIA.

182

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

484 GENERA MORBORUM

CL. VII. DOLORES.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt.

O. I. V A G I.

Dolores et molestiae vagae saepius universales aut cutaneae ad phlegmasias non referendae.

183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraei* definit.

Offsum dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnosa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepito, cum tussi, coryza, &c.

G. V. ANXIETAS. 187

Molestia quae ad continuam loci mutationem
cogit.

G. VI. LASSITUDO. 188

Molestia cum debilitate quae ad quietem in-
vitat.

G. VII. STUPOR. 189

Molestia quae sensum tactus obscurat.

G. VIII. PRURITUS. 190

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

G. IX. ALGOR. 191

Molestia qualis a summo aëris frigore excita-
tur.

G. X. ARDOR. 192

Molestia qualis a summo aëris calore produ-
citur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Gravativus capitis dolor.

50 GENERA MORBORUM

- 194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

- 195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

- 196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia
et lachrymatione.

- 197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

- 198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

LIBRARY

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

- 199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens fine notabilis respirationis laesione.

- 200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago fine febre acuta.

G. XIX. CARDIOMUS.

201

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis,
cum sensu ponderis et magnae molis pul-
santis a minimo motu increscens.

O. IV. DOLORES Abdominales
Interni.

G. XX. CARDIALGIA.

202

Molestia in stomacho syncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA.

203

Quicumque dolor notabilis et constans in re-
gione stomachi, qui continua animi defec-
tione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia
ut gastritis.

G. XXII. COLICA.

204

Dolor intestinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA.

205

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia
quaevis in regione hepatis, sine pyrexia a-
cuta.

52 GENERA MORBORUM

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retraktione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. D O L O R E S Externi et Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii.*

Dolor abdominis et spinae dorsi in brachiorum paralyſi aut convulsiones definens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem sae-
pius inducens.

G. XXXII. PROCTALGIA. 214

Dolor podicis citra tenesmum.

G. XXXIII. PUENDAGRA. 215

Dolor genitalium citra dysuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONS.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria soni, cuius nullum est extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis

periculo versari ex ructu, palpitatione, ali-
isque levidensibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS.

221

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium mu-
nia exsequuntur, et se saepe diversis pericu-
lis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut aversationes depravatae.

G. VII. PICA.

222

Alimentorum consuetorum aversatio, cum
inassuetorum, satisque insalubrium, appe-
titu.

G. VIII. BULIMIA.

223

Appetitus esculentorum copiae majoris quam
quae digeri possit.

G. IX. POLYDIPSIA.

224

Appetitus majoris solito copiae potulento-
rum.

G. X. ANTIPATHIA.

225

Quorundam objectorum tanta aversatio ut ex

56 GENERA MORBORUM

eorum visu, vel olfactu aeger gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraenee veneris desiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum averfatio, saepius a morsu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

G. XVIII. AMENTIA. 233

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diurno.

G. XIX. MELANCHOLIA. 234

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diurno.

G. XX. MANIA. 235

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diurno.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 236

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VISANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriae feriatio.

G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae
quantitate, qualitate, desuetudine notabi-
lis est.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejus-
tio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis e naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectatio cum tussi sine pyrexia
acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis e gingivis saepius foetidis,
putridisve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomi-
torio conatu.

G. V. HÆMATURIA.

243

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

G. VI. MENORRHAGIA.

244

Sanguinis per uterus aut vaginam fluxus vi-
tiosus.

G. VII. ABORTUS.

245

Foetus immaturi, saepius cum menorrhagia
ex utero exclusio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitio-
sa per os aut anum reiectio.

I. *Alvifluxus sanguinolenti.*

G. VIII. HEPATIRRHOEA.

246

Alvifluxus per inferiora ferofo-cruentus nec
ater nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS.

247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto maris-
cis ruptis obsito.

60 GENERA MORBORUM

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminosa, saepe tenesimodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per superiora, vel inferiora frequens reiectio.

II. *Atvifluxus non sanguinolenti.*

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aeri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynbia, alvi constipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominalis, virium prostratione et non raro surarum crampis.

G. XVI. DIARRHOEA. 254

Excrementitorum humorum frequens, vel
intempestivo dejectio.

G. XVII. COELIACA. 255

Albescentium, aut chilacearum materierum
dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix
mutatorum dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intensa de-
jiciendi cupiditate, et assiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. EPHIDROSIS *Hippocratis.* 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempestivi-
tate peccantis effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, seba-
cei, vel purulenti effluxus.

62 GENERA MORBORUM

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr.* *Gorræi.*
Def. Med.

Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus
sine ozæna, saepius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivæ vel muci sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr.*
Galen. in Aph. 8. lib. 5.

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subito post pastum potulentorum cum magna siti per urinae vias, emissio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, saepius ardens, urinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentæ, albescentis, aut viscido-mucosæ materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* 267Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Serofo-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi seminalis ex urethra, aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuffon.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn. gen.* 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

64 GENERA MORBORUM

272 G XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterus emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. C A C H E X I Æ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu de-
pravatio.

O. I. M A C I E S.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. T A B E S. 275

Mácies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. P H T H I S I S, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta,
tussi, dyspnoea, et utplurimum puris sputo.

G. III. A T R O P H I A. 277

Macies sine febre.

G. IV. A R I D U R A, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

O. II. I N T U M E S C E N T I Æ.

Deformitas a volumine adaucto.

66 GENERA MORBORUM

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescentia universalis ab adipे molesta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescentia, mollis, pallida, non elastica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescentia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

O. III. HYDROPS PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a flui-

do intra cavum capitis, abdominis, uteri,
vel vesicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis
aut elasticus, a fluidi intra ipsum conge-
stione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tensus elasticus sub di-
gito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*. 287

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu verte-
brarum lumbarium in recens natis protu-
berans cum anaesthesia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non ela-
stico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogastrii in mulieribus successive crescens
tumor, uteri figuram referens, pressioni ce-
dens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate
diversus.

68 GENERA MORBORUM

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

292 G. XVIII. METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogastrii ex urinae retentione saepius intra vesicam.

Species sunt.

I. Ischuriae renales.

Ischuria (*Nephritica*) a renum inflammatione,
S. sp. 1. *Schacht.* Institut. med. pract. lib.
VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syst. prax. med.
de ischur. *Fabric.* *Hildan.* de lithot. cap. IV.
Leal a Fonte, Cons. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib.
III. sect. XXIV. obs. IV. § 3. *Schenck.* lib.
III. de ischur. fals. cap. IV. et V. *Etmüller*
Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (*Nephrolithica*) a renum calculo, S. sp.

2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison.* de morb. a colluv. serof. *Schenck.* de ischur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. et Medic. septentrional. de ischur.

Ischuria (Nephroplethora) renalis a plethora, S. sp. 3. *River.* Cent. I. obs. 1. et 89. *Etmull.* *Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Ludwig.* Instit. med. clin. *Seb. Nasii Specul.* method. med. pag. 167.

Ischuria (Lunatica) renalis lunatica, S. sp. 4. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 49.

Ischuria (Nephropastica) renalis spasmodica, S. sp. 5. *Schacht.* *Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Differ. epist. tom. 1. *Raulin des malad.* vapor. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1715.

Ischuria (Nephremintica) renalis verminosa, S. sp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict.

Ischuria (Nephrothromboides) renalis a sanguine congrumato, S. sp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de laef. urin. secret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort.* *Gaub.* loc. citat.

Ischuria (Nephropyica) a renum purulentia, S. sp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort.* *Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sal.* *Divers.* de affect. particularib. cap. 14.

70 GENERA MORBORUM

Ischuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitosa
seu mucosa, S. sp. 9. *Sal. Divers.* loc. citat.
Grafi Ephem. natur. cur. ann. III. obs. 212.
Schacht. Cort. Gaub. Mercat. loc. citat. *Va-*
rand. de ren. affect. *Bonet. Sepulchr.* de if-
chur. obs. IV. V.

Ischuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S.
sp. 10. *Sal. Divers. Mercat.* loc. citat. *Horst-*
tom. II. lib. IV. obs. 49. Marcel. Donat. His-
tor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. Barthol.
Cent. IV. epist. 18. 38. 39. Hoechstet. Obs.
Dec. V. cas. 20. Claud. Chaptal. pract. Mons-
pel.

Ischuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione
suppleta, S. sp. 11.

- a. A diarrhoea et sudore, *Marcell. Donat.*
Hist. med. mirab. lib. IV. cap. 27. Schenck.
lib. III. de diabete, obs. 9.
- b. Ab otorrhagia, *Sennert. ex plat. pract. lib.*
III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.
- c. A perspiratione, *Vandermond. Journ. de med.*
tom. IV.
- d. A sudore, *Vandermond. Journ. de med.*
tom. X.

2. Ischuriae uretericae.

Ischuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria,
S. sp. 12. *Sal. Divers.* loc. citat. *Ludwig.*

Instit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.*

Instit. pract de ischur. spur.

Ischuria (Ureterolithica). Ischuria ureterica calculosa, S. sp. 13. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Essais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal.* Divers. loc. citat.

Ischuria (Uretero-thromboides) Ischuria ureterica, a sanguinis grumo, S. sp. 14. *Sal.* Divers. *Schacht.* *Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. obs. I.

Ischuria (Uretero-phlegmatica) ureterica a pituita, S. sp. 15. *Gort.* Prax. med. syst. *Schacht.* *Sal.* Divers. loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sebast.* *Nas.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan.* Ferdinand. hist. 97.

Ischuria (Ureteropyica) ureterica purulenta, S. sp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht.* *Sal.* loc. cit.

Ischuria (Ureterostomatica) ab orificii ureterum inferioris clausura, *Theod.* *Eller.* Miscell. Berlin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obs. 17. *Lieutaud.* Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1753. *Franc.* *Sylv.* *Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obs. anat. pag. 62.

3. Ischuria vesicales.

Ischuria (Cystitica) a vesicae inflammatione, S. sp. 18. *Schacht.* Institut. practic. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1704. 1753. *Boneti Sepulchr.* lib. III. de urin. suppress. *Forest.* lib. XXV. observ. 27. 28. *Zacuti Lusitan.* ex *Galen.* Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150.

Ischuria (Cystolithica) a vesicae calculo, S. sp. 19. *Tulpii Observ.* med. lib. IV. cap. 37. *Effais d'Edinburg,* tom. IV. *Foresti lib.* XXV. obs. 23. *Fabric. Hildani,* Cent. III. observ. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. seros. *Boneti Sepulchret.* de urin. suppress. observ. X. &c.

Ischuria (Cystospastica) a sphincteris vesicae spasmus, S. sp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebas. Nasii Specul.* method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de ischur. *Schachtii, Gorterii, Gaubii, Varendaei,* loc. citat.

Ischuria (Cystoplegica) a vesicae paralyssi, S. sp. 21. *Lieutaud.* Compend. medic. de ischur. *Zacut. Lusitan.* ex *Galen.* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serrane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Effais d'Edinburg, tom. artic. 32.

Ischuria (Polyurica) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri Praelect.* in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de *ischuria.* *Paraei lib.* XVI. cap. 48. *Sennert.* *Pract.* lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. *Etmulleri,* *Riverii,* *Varandaei* de *ischur.* &c.

Ischuria (Cystopyica) vésicalis purulenta, *Felic.* *Plateri Mantif.* Obs. 29. *Camerar.* *Ephem-* natur, curios. tom. II. *Zacuti Lusitani ex Galeno,* Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii Specul.* method. med. part. 11. pag. 167. *Andre des maladies de l'urethre,* observ. 16. *Vandermonde Journ.* de med. tom. IX.

Ischuria (Cystothromboides) vésicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini consult.* 141. *Fabric.* *Hildani Cent.* III. observ. 66. *Foresti lib.* XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani ex Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem *Prax.* med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati de* morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (Cystophlegmatica) vésicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati loc.* citat. *Schacht.* *Instit.* medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri de* *ischur.* vesicat. *Amati Lusitani,* Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani,* *Prax.* med. admirab.

lib. II. observ. 64. Boneti ex Thomi Bartholin. de urin. suppress. observ. 17.

Ischuria (*Ectopocystica*) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, Verdier Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. Felic. Plater. observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, Verdier ex Noel. lib. citat. obs. 17.

Ischuria (*Cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. Dolonaei Observ. medic. cap. 47. Schenck. lib. III. de ischur. observ. 6. Wepferi Dissert. de apopl. pag. 391. Vandermonde Journ. de med. tom. IX. pag. 261. Boneti Sepulchret. de urin. suppress. observ. 18. § 4. Schacht. Gaubii, loc. citat.

Ischuria (*Hysterocystica*) vesicalis ab utero, S. sp. 28.

a. Gravido, Nordnian. Dissert. de ischur. gravidar. Mauriceau, lib. I. cap. XV. Roderici a castro, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, Boneti ex Riolani de urin. suppress. Vandermonde ex Daran. Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, Hippocrat. de morb. mulier. lib. 12. Sennerti Pract. lib. IV. part. I. sect. II. cap. X. XI. Schenck. lib. IV. de mol. fals. Schachtii, Gaubii, loc. citat.

d. Tumoribus distento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac supra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann*. Dissert. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac supra cap. XVI.

Ischuria (Atretarum) urethrocyistica a menstruis in vagina retentis, S. sp. 29. *Amyand* Transact. philos. ann. 1732. No. 442. art. 3. pag. 45. *Schenck*, lib. IV. de part. genit. mulier observ. 9. *Heister*. Chirurg. tom. II. pag. 951. *Astruc*. de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Ischuria paradoxa, S. sp. 30. *Morgagni* Epistol. *Le Clerc*. Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.

4. Ischuriae urethrales.

Ischuria (Perinaealis) urethralis a perinaei tumore, S. sp. 31. *Galen*. lib. de affect. loc. et ex eo *Zacuti Lusitan*. Hist. 149. *Vandermonde* ex *Daran*. Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp*. Observ. med. lib. III. cap. X. *Forest* lib. XXVI. obs. 2.

Ischuria (Urethrolithica) a calculo urethrae impasto, S. sp. 32. *Schmid*. Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obs. 89. *Winckler*. ibid. tom. VI. obs. 34. *Zacut. Lusitan*. Prax. med. admirab. lib. II. obs. 66. 67. 68. *Tulp*. Observ. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet*. Sepulchr. de urin. sup.

press. obs. 14. Barthol. cent. IV. epist. 5. Heister. Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ischuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infaciente, S. sp. 33. Bonet. Sepulchr. et medic. septent. Manget. Biblioth. med. pract. Amat. Lusitan. cent. V. obs. 71. Forest. libr. XXV. obs. 25. Varand. de ischur. Lud. Spin. Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 69.

Ischuria (*Urethrothromboides*) a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. Bonet. Med. septentrion. de ischur. et sepulchr. de urin. suppres. obs. XI. Forest. lib. 25. obs. 25.

Ischuria (*Urethropyica*) a pure urethram obstruente, S. sp. 35. Bonet. Med. septentr. de ischur. Forest. Scholio modo citat. Boerhaave Praefat.

Ischuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. sp. 36. Hist. de l'Acad. R. des sc. ann. 1714, hist. pag. 22.

Ischuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminosa, S. sp. 37. Joan. Petr. Albreicht. Vid. Bonet. Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. et Manget. Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. spectant. Vandermonde Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. Joan Rhodii Centur. 3. obs. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obs. 77.

Ischuria (*Urethritis*) ab urethrae inflammatione, S. sp. 38. Hildan. Cent. IV. obs. 54. Forest.

de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. versus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vesic. cap. VII. *Bonet.* Medic. septentr. de ischuria, cap. 1. No. V. *Gouillard.* de malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ischuria (Carunculosa) a morbis, ut vocant, urethrae, S. sp. 39. *Amato Lusitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. *Jejur.* 48. *Sharp* Recherches critic. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *André* des maladies de l'urethre, passim.

Ischuria (Hydroccloides) ab urethrae ruptura in scrotum hiante, S. sp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68.

Ischuria (Cryptopyica) a penis intra corpus retractione, S. sp. 41. *Fred. Hoffm.* Consult. de morb abdom. cas. 105.

Ischuria (Peridesmica) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42. *Bonet.* med. septentr. de Ischuria, cap. 1. No. VIII.

Ischuria (Phimofica) urethralis a phimosi, S. sp. 43. *Horst.* tom. II. lib. IV. pag. 274. *Gouillard.* de malad. de l'urethre, *Heist.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de ischur. obs. XV.

Ischuria (Aspadialis) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs. pag. 221.; *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppres. observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. § VI.

O. IV. T U B E R A.

293 Tumores partium solidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carniū marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Synopsis.

Tumor scirrhosus glandularum colli, mesenterique, cum labiis et naſo crassioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancrosa cum doloribus lancingantibus.

297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae setaceae vel corniculatae cutim exasperantes.

298 G. XXIV. MALIS.

Tumores saepius purulenti, vel ulcera, cum insectis vermiforibus, paſſim enata.

299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excreſcentia fungosae, mori instar granulæ sae saepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPE TIGINES.

Morbi chronicī saepius contagiosi qui cutis excrementias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

G. XXVI. SYPHILIS.

300

Post impurum concubitum ulcuscula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhœa, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

G. XXVII. SCORBUTUS.

301

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potissimum tibiarum.

G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

302

Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosa, in extremis artibus anaesthesia.

G. XXIX. LEPROSA.

303

Tuberculæ callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

80 GENERA MORBORUM

304 G. XXX. SCABIES.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIAE.

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginosus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui 309
falso nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime
flavis, saepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordi-
nibus.

G. XXXVI. PHTHIRIASIS. 310

Exortus pediculorum vel insectorum pedicu-
lis affinium ex diversis corporis partibus,
quas porrigine, ulcusculisque defoedant,
aut puncturis, pruritu disrueciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.*

311

Capilli invicem complicati, agglutinati in
globos inextricabiles, saepius cum phthi-
riasi.

G. XXXVIII. ALOPECIA.

312

Capillorum lapsus cum cuticulae desquauma-
tione.

82 GENERA MORBORUM

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida diffusio-

lutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

P A R S (S E C U N D A)

G E N E R A
M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Illustri

C A R O L O A. LIN N E,

E Q U I T E A U R A T O, A R C H I A T R O, &c. &c.

U p s a l i æ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

M O R B I.

Febriles (e sanguine in medullam.)

| | |
|---------------|-----|
| EXANTHEMATICI | I |
| CRITICI | II |
| PHLOGISTICI | III |

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI

IV

Judicii MENTALES

V

Motus

QUIETALES

VI

MOTORII

VII

Fluidi Secretionis

SUPPRESSORII

VIII

EVACUATORII

IX

Solidi.

Interni DEFORMES

X

Externi VITIA

XI

E X A N T H E M A T I C I Febris cum efflorescentia cutis maculata.

C R I T I C I Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

P H L O G I S T I C I Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

D O L O R O S I Doloris sensatio.

M E N T A L E S Judicii alienatio.

Q U I E T A L E S Motus abolitio.

M O T O R I I Motus involuntarius.

S U P P R E S S O R I I Meatuum impeditio.

E V A C U A T O R I I Fluidorum evacuatio.

D E F O R M E S Solidorum facies mutata.

V I T I A Externa palpabilia.

S Y M P T O M A T A se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

F E B R I S dignoscitur Pulsu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctenaæ (273) aliquot in Abdomine sive
Artibus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) seu *Bubones* (271) gran-
graenosi (233).

Febris Synocha (12) acutissima, funestissima,
Vertigo (74), Anxetas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Pustulae (274) erysipelaceæ, suppurantes, ef-
charoticae (280), deciduae, cicatrisantes
(317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40),
Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evanescen-
ti-furfuraceæ.

88 GENERA MORBORUM

Febris Synocha (12), *Sternutatio* (154), *E-*
piphora (172), *Tussis* (155) *sicca.*

V. PETECHIA.

Sudamina (321) *livido-lurida, superficialia,*
insensibilia.

Febris exacerbans (23), *Asthenia* (92), *A-*
grypnia (130).

VI. SYPHYLIS.

Nodi (262), *Ulcuscula, Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) *nocturna, dolore ostocopo*
(61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196),
Angina (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) *rotundae, immersae, diversi-*
colores, confertae, intacta facie, prurigi-
nosae.

Febris Synocha (12), *Sodore* (207) *foetido,*
punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) *inaequalia, ruberrima, dila-*

bilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia,
furfuraceo-evanescentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. A P H T A.

Escharae (280) albidae, rotundae, ductibus
excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia
(96).

III. S O L I T A R I I.

X. E R Y S I P E L A S.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Prototypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos refereretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anæsthesia* (118), *Lipuria*, *Carpologia* (135) *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra septimanam dimidiām.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra septimanam unicām.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris tertii.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxysmi similes alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxysmi dissimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) sit, aut potius Rheumatismus (62).

Apyria est deflagraatio febris.

Phthisis (208) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.

Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*

Febris Synocha (12), *Cephalalgia* (40), *Furor* (68), *Anxietas* (89), *Syringmos* (72), *Ophthalmia* (43), *Carpologia* (135), *Oblivio* (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*

Febr. Peripneumonia (34), *Phrenitis* (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*

Febr. Synocha (12), *Dyspnoea* (160), *Tussis* (155), *Haemoptysis* (179), *Pleuritica* (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphemerina (20), *Lipyria*, *Anxietas* (89), *Vomitus* (183) *ingestorum*, *Cardialgia* (48).

94 GENERA MORBORUM

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Intestini*.

Febr. cum evacuatione abdominis, **colica** (50) atroci, tensiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani*.

Febr. Proctica (59) cum Tenesmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Vesicae*.

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali*.

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135). Asthenia (92), Immobilitas, Anaesthesia (118), Aphonya (115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis*.

Febr. Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio

(164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis*.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Fecinoris*.

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis*.

Febr. Tetartophia (22), Respiratio interfecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis*.

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) Uteri.

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) Partis Externae.

*Febris ex partis externae tumore pulsatorio,
Rubore tensivo, calente.*

Lipyria dum externa frigent, interna fervent.

Prototypus Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delirium (65) quasi primus gradus Phrenitidis est.

IV. DOLOROSI.**I. INTRINSECI.****XL. CEPHALALGIA.**

Capitis totius aut portionis dolor gravatus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tensivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor pressorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

98 GENERA MORBORUM

XLVII. SODA.

Oesophagi dolor rancido deurens Ructibus
(181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiae dolor scobiculi subsyncopal (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigastrii.

L. COLICA.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus
(123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextrī.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, suspiria
(150).

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tussi
(155), Haemoptysi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus ;
a *Synovia corrupta*.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus ;
a *Periostio infecto*.

LXII. RHEUMATISMUS.

Muscularum dolor ad motum ;
a *Tunica cellulosa infecta*.

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

*Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem
inducens.*

Raphania (145) dolore intenso his affinis: Ob Spasmos
vero et Convulsiones sequentibus.

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Insania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Insania chronica, universalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Insania chronica, universalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Insania chronica, partialis, furibunda, metitculosa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.

Insania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Insania chronica, partialis, moesta, meditabunda.

II. IMAGINARI.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni tinnitus* falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis objecti* falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borbo-
rygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpi-
tationes (132), Praecordia tremula, Per-
fusio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *sommiantis* fortior, qua motus vo-
luntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriae Affiniumve.*

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreae (saepe a morsura Insecti).*

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi lacerandique innocuos
(saepe a Morsura Mammalis.)*

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum cum Rigore (141)
et Sardiasi (125); (saepius praecedenti mar-
ritata).*

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objec*t*i* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum* rerum.

(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilis constans musculorum ponderosa,
quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilis successiva virium vitalium, non re-
paranda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilis successiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superstite
Pulsu Menteque.

XCIV. SYNCOPÆ.

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis
Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque persi-
stens.

O

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparet cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio.
(65) oblivioso.

XCIX. CATAFORA.

Sopor constans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, respirationeque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque stertorosa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu
formicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. CATARACTA.

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. AMAUROSIS.

Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilata.

CXI. SCOTOMIA.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

108 GENERA MORBORUM

CXIII. ANOSMIA.

Olfac̄tus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Gustus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tac̄tus sensationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

VII. M O T O R I I.

I. S P A S T I C I.

CXXI. S P A S M U S.

Artus distentio violenta, subitanea, fugax.

CXXII. P R I A P I S M U S.

Penis spastica intumescentia.

CXXIII. B O R B O R Y G M U S.

Intestinorum contractio boans.

CXXIV. T R I S M O S.

Mandibularum clausura arcta.

CXXV. S A R D I A S I S.

Oris retractio risum mentiens, fugax.

CXXVI. H Y S T E R I A.

Praecordiorum pressio sub pectore, cum flatulenta (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione.

XI^o GENERA MORBORUM.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum sensibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum insensibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Sensorii rigiditas spastica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viscerisve motus subsultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum subsultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum subsultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inscia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio sonora; vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentissima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibusdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis sibilans elccutio ab arescentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi
(125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inspiratio intersecta, singultuosa, cito, suspiriosa,
cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.

Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.

Ad sinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium subigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.

Ad sanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

*Respiratio angustatione faucium continua,
sine febre.*

A Tracheae angustatione.

CLIX. EMPYEMA.

*Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo
thoracis, post febrim.*

A pure in cavum Thoracis effuso.

CLX. DYSPNOEA.

*Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sen-
su angustationis faucium.*

A pulmonum substantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

*Respiratio stertorosa (156), laboriosa, diffici-
lis chronica.*

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

*Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158),
acuta, subitanea.*

A sanguinis per pulmones difficili transitu.

CLXIII. EPHIALTES.

*Respiratio profunda, suffocans (158), dormi-
entis in dorso cum Somnio laborioso.*

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) *Crepitusque* (194) *impeditus*,
cum abdominis intumescientia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Faecum exoneratio impedita,

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus,

CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

Menstrua suppressa s. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio.

CLXX. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

CLXXI. STERILITAS.

Geniturae suppressio,

IX. EVACUATORII.

L C A P I T I S.

CLXXII. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXIII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIV. HÆMORRHAGIA.

Naris sanguineus fluxus.

CLXXV. CORYZA.

Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus.

CLXXVI. STOMACACE.

Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVII. PTYALISMUS.

Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

118 GENERA MORBORUM

II. THORACIS.

CLXXXVIII. SCREATUS.

Faucis muci sonora evacuatio.

CLXXXIX. EXPECTORATIO.

Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.

CLXXX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.

CLXXXI. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvisa eva-
cuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXII. RUCTUS.

Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXIII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIV. VOMITUS.

Rejectio ingestorum convulsiva.

CLXXXV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (184) sanguinis.

CLXXXVI. ILIACA.

Vomitus (184) cum Obstipatione (166) fixa
et Colica (50).

CLXXXVII. CHOLERA.

Vomitus (184) cum Diarrhoea (188), Colica
(50.)

CLXXXVIII. DIARRHOEA.

Dejectio *Foecum* liquidarum frequens.

CLXXXIX. LIENTERIA.

Diarrhoea (188.) Cibi immutati.

CXC. COELIACA.

Diarrhoea (188) Chymi.

CXCI. CHOLIRICA.

Diarrhoea (188) rubella, absque Colica.

CXII. DYSENTERIA.

Diarrhoea (188) cruenta, cum Colica (50),
Tenesmo (194.)

CXIII. HAEMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abs-
que Colica.

CXIV. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

120 GENERA MORBORUM

CXCV. CREPITUS.

Dejectio Flatuum copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCVI. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVII. STRANGURIA.

*Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa
micturitio.*

CXCVIII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCIX. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CC. GLU S.

Urinae viscosae micturitio.

CCL. GONORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

CCII. LEUCORRHœA.

Mucile sinu muliebri effluxus.

CCIII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIV. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCV. ABORTUS.

Foetus praematura ejactio.

CCVI. MOLA.

Massa carnae, intus cysticosae, ex utero e-
jectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVII. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVIII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

Q

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCIX. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnœa (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

CCX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione.*

CCXI. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

CCXII. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXIII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.

II. T U M I D O S I.

CCXIV. P O L Y S A R C I A.

Corporis pinguedinosa intumescentia.

CCXV. L E U C O P H L E G M A T I A.

Corporis emphysematosa (229) intumescentia.

CCXVI. A N A S A R C A.

Corporis oedematoso (230) intumescentia.

CCXVII. H Y D R O C E P H A L U S.

Capitis oedematoso (230) intumescentia, histibus futuris cranii.

CCXVIII. A S C I T E S.

Abdominis oedematoso (230) intumescentia.

CCXIX. H Y P O S A R C A.

Abdominis nodosa intumescentia.

CCXX. T Y M P A N I T E S.

Abdominis flatulenta (165) intumescentia, constans, sonora.

CCXXI. G R A V I D I T A S.

Abdominis a foetu intumescentia nimia.

III. DECOLORRES.

CCXXII. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematosus (230), cum debilitate, moerore.

CCXXIII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta (78).

CCXXIV. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obstipatio Bilis*).

CCXXVI. PLETHORA.

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160).

HYDROPSIS nomine veniunt *Anasarca* (216), *Ascites* (218), *Hypofarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), et *Tympanites* (220).

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVII. ARIDURA.

Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVIII. DIGITIUM.

Articuli exsiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intensissimo.

CCXXIX. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulosam Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

CCXXX. OEDEMA.

Lympha stagnans intra tunicam cellulosam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

CCXXXI. SUGILLATIO.

Cruor effusus in tunicam cellulosam.

Tumor obsoletus, latus, luridus.

CCXXXII. INFLAMMATIO.

Sanguis obstructus in vasis.

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

CCXXXIII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIV. GANGRAENA.

Inflammatio s. Suppuratio suffocata, *morta serpens* in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

CXXXXV. SPHACELUS.

Gangraena (234) omnium solidorum partis.

Mortificatio putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*).

CCXXXVI. FRACTURA.

Ossis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVII. LUXATURA.

Geniculi solutio citra substantiae dissolutio-nem.

CCXXXVIII. RUPTURA.

Tendinis solutio citra substantiae dissolutio-nem.

CCXXXIX. CONTUSURA.

Fibrarum solutio citra substantiae dissolutio-nem.

CCXL. PROFUSIO:

Sanguinis effluxus copiosus e substantiae dis-solutione.

CCXLI. VULNUS.

Substantiae dissolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLII. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLIII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutisque *laceratione* factum.

CCXLIV. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* *punctione* factum.

CCXLV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLVI. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eschara (281).

CCXLVII. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVIII. INTERTRIGO.

Cuticulae erosio madens dolensque.

CCXLIX. RHAGAS.

Fissura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae.*)

CCL. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

CCLI. CACOETHES.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLII. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depascens, cicatricem inducens.

CCLIII. CARCINOMA.

Ulcus Schirri (284) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radiatum, periodice dolens.

CCLIV. OZENA.

Ulcus intra antrum Highmori.

Ulc. occultum e Naribus foetens;

CCLV. FISTULA.

Ulcus cortice calloso-vaginatum.

Ulc. sinuoso penetrans, intus cortice obtec-
tum, ore angustatum.

CCLVI. C A R I E S.

Ulcus Ossis separato periostio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus in-
dolens, sanie passim nigra se prodens.

CCLVII. ARTHROCAE.

Ulcus Medullae cum ossis Carie (256).

Ulc. malignum, tumens, dolore ostocopo (61).

CCLVIII. COCTYTA.

Animalculum venenatum intra partem re-
ceptum.

Partis stigma dolore furioso.

CCLIX. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub *tendinibus* periostioque.
Partis rubor dolentissimus, os destruens.

CCLX. PERNIO.

Partis ustio *Gelu* facta.

Pars albo caerulescens, tempestatibus recru-
descens, saepe exulcerans.

CCLXI. PRESSURA.

Digiti inflammatio (232) a *frigore*, in casum
unguis tendens.

Inflam. Digitii circum unguis in suppuratio-
nem vergens.

CCLXII. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem secans.

Inflammata. digitii cum ulceratione laterali
unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXIII. LEPROZA.

Pustulae (275), Eschara (281) sicca colorata,
cum Nodis immeritis mobilibus indolenti-
bus fuscis Rhagadibusque (249).

CCLXIV. TINEA.

Pustulae (275) *Capillitii* siccae, eschara (281)
albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erec-
tis bulboso-radicatis.

CCLXV. ACHOR.

Pustulae (275) exulcerantes, manantes com-
muni pinguedinofo.

CCLXVI. PSORA.

Pustulae (275) ichorosae, escharoticae (281),
noctu imprimis pruriginosae (64).

CCLXVII. LIPPITUDO.

Pustulae (275) excoriantes *Palpebrarum*
margines.

CCLXVIII. SERPIO.

Pustulae (275) siccae, obsoletae, serpentes,
subfarinaceo-desquamantes.

CCLXIX. HERPES.

Pustulae (275) escharoticae (281), basi com-
muni erysipelacea (10).

CCLXX. , VARUS.

Pustulae (275) *Glandulurum sebacearum* ru-
brae, dispersae, chronicae.

CCLXXI. BACCHIA.

Vari (270) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXII. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

CCLXXIII. ANTHRAX.

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erisipelaceus (10), immensus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

CCLXXIV. PHLYCTENA.

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, erupta dolens.

CCLXXV. PUSTULA.

Vesicula purulenta, turgens, dehincens pure.

CCLXXVI. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

CCLXXVII. HORDEOLUM.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVIII. VERRUCA.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CCLXXIX. CLAVUS.

Verruca (278) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

CCLXXX. MYRMECIUM.

Verruca (278) madida, mollis, denudata.

CCLXXXI. ESCHARA.

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagulata, decidua.

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXII. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. VARIX.

Venae dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

134 GENERA MORBORUM

CCLXXXIV. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

CCLXXXV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

CCLXXXVI. AATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

CCLXXXVII. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

CCLXXXVIII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus indolens.

CCLXXXIX. NATTA.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminens, pulposus, indolens.

CCXC. SPINOLA.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum processibus dehiscen-tibus.

CCXCI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIAE.

CCXII. HERNIA.

Intestini obtecti ultra propriam sedem pro-trusio.

CCXIII. PROLAPSUS.

Viscus nudum relaxatum, elongato propen-dens ultra proprium locum.

CCXCIV. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCVI. PTERYGIUM.

Cuticula excrescens e cantho oculi, superfici-em ejus obtegens.

136 GENERA MORBORUM

CCXCVII. ECTROPIUM.

Palpebra inferior resupinato-inversa.

CCXCVIII. PHIMOSIS.

Praeputii intumescentia inflammata, glandem denudans incarceransve.

CCXCIX. CLITORISMUS.

Clitoridis intumescentia extra sinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCC. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCCI. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCII. LORDOSIS.

Ossium incurvatio.

CCCIII. DISTORTIO.

Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIV. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCV. STRABISMUS.

Oculi distorti et inaequaliter moti.

CCCVI. LAGOPHTHALMIA.

Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

CCCVII. NYCTALOPIA.

Oculi visus nocturnus.

CCCVIII. PRESBYTIA.

Oculi visus remotus.

CCCIX. MYOPIA.

Oculi visus approximatus.

CCCX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in suis alveolis.

CCCXI. LAGOSTOMA.

Labium superius oris fissum.

CCCXII. APPELLA.

Praeputii abbreviatio absque inflammatione.

CCCXIII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIV. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indissolubilis.

CCCXV. HIRSUTIES.

Pili copiosiores longioresque.

CCCXVI. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVII. TRICHIASIS.

Ciliorum distortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVIII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXIX. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXX. MORPHÆA.

Macula alba, depressa, lata.

CCCXXI. VIBEX.

Lineae sanguinicolores subcuticula.

CCCXXII. SUDAMEN.

Maculae rubrae, pulicares, glabrae, pungentes, evanescentes.

CCCXXIII. MELASMA.

Macula caerulescens in parte tecta.

CCCXXIV. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

CCCXXV. LENTIGO.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

CCCXXVI. EPHELIS.

Color *fusca* partis insolatae.

*Heu mihi! tet mortes Homini, quot membra, malisque
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.*

THEORIA.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabili-um, et fluida haec vicissim per solida prae-parat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo spiri-tuoso liquido corticali, sed *flagrat* elec-trico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingra-tum* noxiun.
6. Fluidum corticale, e quo solida; solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis pu-trido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab acescente, *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejicit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhaustatur (a).
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat.
10. CORTICALE solidum deteritur viatiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi* dicti.
11. MORBI tolluntur contraria caufsa (c); hanc ut citius natura obtineat, Toxicæ misceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare,

(b) Dolor dolorem trahit.

(c) Morbi morbis curantur.

12. CONTRARIA haec ex sapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoscenda sunt: E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae*.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. S A P I D A.

Agunt in *Corticale Vitale*:

in *Fluidis.* in *Solidis.*

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------|---|
| 1 AQUOSA. | Mundificantia, Absorbentia, | Hume&tantia. Exsiccantia | SICCA. | 1 |
| 2 ACIDA. | Refrigerantia, Balsamica, | Attenuantia. Tonica | AMARA. | 2 |
| 3 DULCIA. | Edulcorantia, Incidentia, | Impinguantia. Corrodentia | ACRIA. | 3 |
| 4 VISCOSEA. | Inviscantia, Penetrantia, | Lubricantia. Abstergentia | SALSA. | 4 |
| 5 PINGUIA. | Obtundentia. Inspissantia, | Emollientia Adstringentia | STIPTICA | 5 |

II. O L I D A.

Agunt in *Medullare Animatum.*

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| Sensum | Excitant | AROMATICÀ, | Sopiant | VIROSA. |
| Motum | Spasticant | ORGASTICA, | Evacuant | NAUSEOSA. |
| Judicium | Acuant | SPIRITUOSA, | Confundunt | TETRA. |
| Libidinem | Provocant | AMBROSIACA, | Suffocant | HIRCINA. |

P A R S T E R T I A.

D E F I N I T I O N E S

G E N E R U M

M O R B O R U M

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

T

TABULA CLASSIUM MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeter naturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESSES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNAZIAE. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut immixtiones.
- VII. HYPERAESTHESSES. Sensationes auctae, vel perversae.

VIII. C A C H E X I Æ. Male colorata
corporis constitutio, cum debilitate.

IX. P A R A N O I Æ. Mentis aberrationes.

X. V I T I A. Mutationes in superficie cor-
poris conspicuae.

XI. D E F O R M I T A T E S. Aberratio-
nes solidorum ab ordine, positura, habi-
tu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

I. F E B R E S.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque revertitur praevio frigore.

I. S I M P L I C E S.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum reddit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die reddit.

V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

150 GENERA MORBORUM

VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die reddit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRU A.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. DUPPLICATÆ.

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. TRIPPLICATÆ.

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. SIMPLICES.

XV. QUOTIDIANA Continua.

Quotidie cum frigore accedit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbor, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. *Typhodes et Sudor Anglicanus ejus species sunt.*

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefatione delirium, mox opprimente iterum sopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta,

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cuius decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crisi singultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscat.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum aversatione liquidorum, singultu, convulsione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia,

II. COMPOSITÆ.

I. Exanthematicæ.

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intetinis, aut stupor in digitis, pustulae pruriētes milii feminis magnitudine, rubrae vel albae, fero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus publicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et maiores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA.*

Variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

* Haec *Varicella* facilime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

II. INFLAMMATORIÆ.

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis

758 GENERA MORBORUM

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravatus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

LI. MEDIASTINA.

Mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, urgente morbo syncope.

LIV. C A R D I T I S.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehementis in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia ; an semper ?

LV. P A R A P H R E N I T I S.

Diaphragmatis inflammatio ; febris continua, dyspnœa, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. G A S T R I T I S.

Ventriculi inflammatio ; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, fitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. E N T E R I T I S.

Intestini inflammatio ; febris assedes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercois retentio, aut dysenteria.

LVIII. H E P A T I T I S.

Jecinoris inflammatio ; febris continua hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis siccâ, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylosae et ichorosae, nullo doloris sensu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOLITIS.

Muscularum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flamma, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. SYMPTOMATICÆ.

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis socia,

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta,
multus sudor, interdum pustulae purulenta.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut
saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri superveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internalium inflammationibus, dum

in suppurationes transeunt, superveniens,
continua.

LXXIX. L E N T A.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. H E C T I C A.

Quotidiana continua vehementior in morbo
longo, cum sudore colliquativa et phthisi.

II. PROFLUVIA.

I. HÆMORRHAGIÆ.

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio
per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpe-
bris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrescit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor sanguineus ; sanguinis tenuis e poris
cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva pro-
fusio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum
foetu immaturo aut mola subsequente.

II. APOCENOSSES.

XCVIII. CATARRHUS.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lachrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum seri tenuioris destil-
latione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus ; catarrhus auris for-
didus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. P T Y A L I S M U S.

Copiosa saliva profusio.

CIV. V O M I C A.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri
e pulmonibus rejectio per tussim.

CV. D I A R R H O E A.

Copiosum sincerorum humorum ex alvo pro-
fluvium, sine vehementi sensu doloris.

CVI. P U O R R H O E A.

Puris sinceri ex alvo excretio.

CVII. D Y S E N T E R I A.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes
alvi dejectio.

CVIII. L I E N T E R I A.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum
descendunt, alimentis assumptis substantia
et colore finitima.

CIX. C O E L I A C A.

Laevum aequalium et quasi chyli aut cre-
moris specie dejectio.

CX. C H O L E R A.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones,
cum periadynia.

CXL. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco steroris, excretio diuturna, cum contabescit.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo excretio tenesmodis, periodica.

CXIII. ENURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita seminis, liquoris, prostatarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis infomnia, ci-
traque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vul-
va profusio.

CXX. EXONEIROYSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex
rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentio-
ris medicamenti colliquantis, urentis, sti-
mulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus
parte.

III. EPISCHESSES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria,
voce haud bene sonora, spiritu nonnihil
difficili, qui nec nisi hiante ori duci potest.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expulsio,
cum intumescentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO:

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinæ suppressio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto
vel ex parte cohabitum.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. D O L O R E S.

CXXXIV. A N X I E T A S.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. B L E S T R I S M U S.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. P R U R I T U S.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

CXXXVII. C A T A P S Y X I S.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII. R H E U M A T I S M U S.

Cutis et muscularum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor; cuius species *chiragra* et *gonagra*.

CXL. C E P H A L A L G I A.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus
occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA,

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivaram dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxetas cordis dolorifica, cum sensu pondersis et pulsatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces afflurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in stomacho cum inextinguibili siti.

CLIX. NAUSEA.

Inani vomendi desiderium.

CLX. COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatio-
ne, nausea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro im-
pacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excremen-
torum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae densae rubrae mictio parca, frequens,
ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ardorem
in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoe-
ticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua
nihil praeter pauca mucosa et cruenta ege-
ritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages.* et *Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra*
Linn.

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluviū sanguinis uterini menstruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthritis in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus.

In aure dicitur *Pyrosis*.

V. S P A S M I.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio
rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud
possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora
curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membra singularis
concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalge-
scunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem et violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulsiva univerfalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepsia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate sensuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.

CXII. RAPHANIA Linn.

Convulsio cum spastica articulorum contraktione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procursiva. *Tarantismus* est species.

CXCIV. C R A M P U S.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. S C E L O T Y R B E.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. A N G O N E.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. G L O S S O C E L E.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. G L O S S O C O M A.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. H I P P O S.

Oculorum constans agitatio ; malum ab ortu contractum.

CC. I L L O S I S.

Oculorum perversio acuta.

CCI. C I N C L E S I S.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSSIS.

Cili superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aëris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aëris e pulmonibus expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *s. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *s. Spasmus Cynicus.*

Spasmus muscularum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *s. Risus Sardonius.*

Involuntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriae-
ve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os
rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta fatus ventriculi inclusi per os ex-
plosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masti-

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *s. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *s. Aëstus volatilis.*

Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

VI. A D Y N A M I Ā.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Sensus motusque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAZIA.

Impotentia, qua se aegri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Sensus motusve aut utriusque defectus in singulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium sub collo, aut saltem medii corporis artuumque inferiorum paralysis.

CCXXVIII. HEMIPLLEGIA.

Paralysis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio, cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, *f. Catoche.*

Subita functionum animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum situm, qui ipsis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus sopor, liberam respirationem sine stertore conservans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipsum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENIA.

Inclinatio in somnum justo major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Visus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasis.

CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.

CCXL. SYNESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Visus noctu saltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum stridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaefitas*,

Vitiosa literarum f et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties*.

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO,

Oscitatio cum artuum extensione.

CCLXV. APNOEA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

CCLXVI. MACROPNOEA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNOEA.

Respirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PINGMA, *Catarrhus suffocatus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum

motusque interceptione, stertore, pulsuque
intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, s. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHEMOS, s. *Ronchus.*

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMI A.

Subita sensus motusque interceptio, cum fu-
dore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac re-
spiratione debili.

CCLXXIV. SYNC OPE.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratio-
ne perceptibili, abolitoque omni sensu, et
extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficultisque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYSIS.

Sterilitas muliebris ; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro ; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis aversatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quae non adsunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repraesentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans.

192 GENERA MORBORUM

CCXCI. DYSOPIA.

Vifus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semet-
ipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu sub-
sequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitra-
ria.

CCC. M A L A C I A.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. P I C A.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehemens desiderium.

CCCII. B O M B U S.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCI. C E L S A.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum obrantium subter cute.

B b

VIII. C A C H E X I Æ.

CCCIV. C A C H E X I A.

Corpus grave atque iners, colore pallido squamidum.

CCCV. C H L O R O S I S.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido vivescente.

CCCVI. I C T E R U S.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

CCCVII. M E L A N C H L O R U S.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII. A T R O P H I A.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hec-tica.

CCCIX. T A B E S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hec-tica, at sine dyspnoea et tussi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hec-
tica, dyspnoea, et tussi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae
intra pectus, strepitum concussione intus
facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphysium protu-
berantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis,
digiti impressi vestigium aliquamdiu reti-
nens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquo-
sus, cum atrophia superiorum partium.
Abdomen impulsu sonum collectae permo-
taeque intus aquae praebet.

* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequre re-
stituitur; in *tabe* et *pthisi* caro simul minuitur.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops saccatus pleurae, peritonaei, aut viceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione et atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomachace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus fauci-
um partiumque obscoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPROA *Graecorum, s. Psora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel par-
tis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustu-
lis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, s. *Le-
pra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, sa-
niem foetidam crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede. valde tumido et
duro.

CCCXXIII. P L I C A, s. *Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab
humore glutinoso ita in cirrhos contor-
quentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in
corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis longa, a magnitu-
dine habituue visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYYSIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione
aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partiſ livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorofis ; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverofa.

IX. PARANOIAE.

CCCXXIX. ATHYRIA.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphrosyne*.

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. MANIA.

Insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum et satyriasis* pro speciebus habeo.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Insania longa cum moestitia ac timore.
Nostalgia ejus species est.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Insania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis

200 GENERA MORBORUM

mente capiuntur, si qua viderint audirentve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morofis,*
Fatuitas.

Mentis imminuta et infirmata functio, seu
quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENITA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque pri-
vatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix men-
tis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam
verum fit existimatum. *Pavor* ejus est
species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et
diversa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. INFLAMMATIONES.

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in summitate digitorum.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digitii lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab ustione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio, aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi saltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox

adurit, pustulas circum se ardentissimas ci-
et, tandem crusta nigra vel cinerea obduci-
tur, et corruptae carnis lobum excutit,
qua exidente ulcus cavum sordidumque
manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in
pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV. ONYX.

Abscessus inter corneae laminas.

CCCLVI. HIPPOPYON.

Abscessus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHION.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abscessus in thorace, latus aut partem ejus
in tumorem attollens, cum febre hectica,
praegressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, simplici phlegmone at-
que phygetlo minor, planior, minusque
rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo
colorem cutis non excedentia, modo ru-
bra fugacissima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra,
prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apostematodes
in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii in-
dolens obduratus.

CCCLXVIII. B U B O N .

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. B R O N C H O C E L E .

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. P A R O T I S .

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. G O N G R O N A .

Collum tumidum.

CCCLXXII. S P A R G A N O S I S .

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. C O I L I M A .

Intumescentia abdominis subita, flatulenta.

CCCLXXIV. S C I R R H U S .

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. C A N C E R .

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, livescens aut nigricans.

CCCLXXVI. S A R C O M A .

Carnis incrementum tuberculi tumorifve specie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adherens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus species *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini infidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorum glutinosum et subruber exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA bifida.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebra- rum dehiscentibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehen- ditur, aquosus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti.*

Tumor tunicae scroti cellulosa aquosus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumescentia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumescentia a flatu.

CCCXII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulosam cutis habitum ingresso formatus.

CCCXIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCLE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Pou-
partii elatio.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis*.

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in supe-
riori et interna femoris parte prope peri-
naeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatum intra ligamen-
ta sacro-ischiatica elatio.

CCCCII. ELYPROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per musculi obliqui an-
nulum, sub qua urina non nisi presso ex-
terius tumore redditur.

CCCCV. CYRTO MA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus, aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermatica-
rum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi ; tumor inter cartilaginem
xiphoiden et umbilicum inque ipso illo,
post pastum auctus, dolore stomachi, vomi-
tionibusque stipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbili-
calis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis,

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquofus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis farcoma aut scirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCOLE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscripitus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. *Actheroma, Steatoma, Testudo, talpa, Meliceris* ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uvae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materialis complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. EXTUBERANTIAE*.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel penibile. Unde species *Acrohordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obsoenit mollis, madida, tactu dolens.

* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *s. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

CCCCXXX. ENCAANTHIS.

Intumescentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Ex crescentia corneae tunicae inhaerescens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Ex crescentia, membranulae forma, rubra supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLEM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere desinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

214 GENERA MORBORUM

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos*,

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Rosacea*.

Varus quasi confluens, cum rubidine aspera maculosa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Asperitas quaedam et duries mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens

IV. PUSTULÆ et PAPULÆ.

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. P H L Y C T Æ N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

CCCCXLIII. H E R P E S , *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *Serpigo* est.

CCCCXLIV. S C A B I E S .

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam sicciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A .

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. H Y D R O A , *Boa*, *Sudamina*.

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine ru-

216 GENERA MORBORUM

bore et sine ullo dolore, ex sudoribus re-
pente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in syno-
cho emergens, contagiosa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in e-
phemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, seminis milii magnitudine,
rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Pustula ab ustione contracta.

V. MACULÆ.

CCCCLI. ECCHYMOA.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso li-
vida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melasma*
speciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIAE.

Maculae pulicum morsui similes, magnitudi-

ne et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latescentes, et plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis,

E e

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini similes pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula subruba aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. DISSOLUTIONES.

I. *Apospasmata*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechnica, cum effluxu sanguinis.

CCCCLXVI. R U P T U R A.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. R H A G A S.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. F R A C T U R A.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. F I S S U R A.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. P L I C A T I O.

Ossium longorum concussio et contorsio circa fracturam.

CCCCLXXI. T H L A S I S.

Calvaria depressa circa fracturam.

CCCCLXXII. L U X A T I O.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

CCCCLXXIII. S U B L U X A T I O.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque interfice dehiscunt.

CCCCLXXIV. D I A C H A L A S I S.

Suturae dimotio.

220 GENERA MORBORUM
CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlim-*
ma.

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis.*

Resolutio cutis in tenues squamulas, deci-
duas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Offis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, liga-
mentorum, citra rupturam, membra mobi-
litatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muscularumque conquassatio dolorifi-
ca, plerumque cum ecchymomate, at citra
vulnus aut substantiae manifestam deper-
ditionem.

CCCCLXXXI. DIABROYSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel
externa.

CCCCLXXXII. A GOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crumentum emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callosis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrascit, atque molles et cadaverosa redditum teturum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterimi odoris, et vehementer dolet.

222 GENERA MORBORUM

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac de-
pascens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem,
sed et vicinas exedit et absumit.

CCCCCCC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum in-
tus curvatum ampliatur, sine callo.

CCCCXCIII. CRIES.

Ulcus in osse cum substantiae et periostei
corruptione, qua os spongiosum et friabile
redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcusula capitis manantia, plurimis ac mi-
nimis foraminulis, unde tenuis et glutino-
sa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lacaea*.

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion*.

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficiaria,
mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris
vel urinae acrimónia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACYROMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subiectis, lo-
quelam, suetum, deglutitionemque impe-
diens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere tulcereve relic-tus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

F

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, os-
siumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*,
Lordosis, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum
vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum de-
scendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et fordes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHIELOS, *Labium leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Ossium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere
sint conspersi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex mor-
bo graviore convalescentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophi-*
asis ejus species, item *Calvities* et *Pelada*.

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duricie callosa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOYSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus,*
Plautus.

Cui pedum medium ab interiori parte non
est cavum, sed planum,

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita
contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenu-
lo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa ef-
fluit.

DXLIX. ATRETA:

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus testis aut ambo absconditi,

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut
utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae,
quasi cornua, nascuntur.

DLIV. ARTEMETISCUS.

Qui membra alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pilii excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevis.

DLIX. G A L B U L U S.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. M O L A .

Massa carne, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia
quaedam occulta, quae non nisi in cadave-
rum sectione se offerunt; velut hydrops peri-
cardii, concretiones viscerum, offescentiae
cartilaginum, membranarum, muscularum-
que, varices venarum majorum, hydatides,
polypi cordis et vasorum, positura viscerum
perversa, bullae aëreæ in venis et pulmonum
superficie, aneurismata aortae, angustiae pae-
ternaturales vasorum et ductuum, ipsorum-
que concretiones.

P A R S Q U A R T A.

S Y S T E M A

M O R B O R U M

S Y M P T O M A T I C U M,

A U T O R E

C L A R. J O. B A P T. M I C H. S A G A R,

M E D. D O C T, &c. &c.

V i e n n æ 1776.

G g

CLAVIS CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidensia, palpabilia,
absque notabili cachexia, pyrexia.

ORDOI. MACULÆ.

- II. EFFLORESCENTIÆ.
- III. PHYMATA.
- IV. EXCRESCENTIÆ.
- V. CYSTIDES.
- VI. ECTOPIÆ.
- VII. DEFORMITATES.

CL. II. PLAGÆ.

Continui solutiones, morbi proprie chirur-
gici persaepe sat graves.

- O. I. SOLUTIONES recentes ple-
rumque cruentae.
- II. SOLUTIONES artificiales re-
centes cruentae.
- III. SOLUTIONES incruentae.
- IV. SOLUTIONES anomalae.

CL. III. CACHEXIAE.

Coloris, figurae, molis, in corporis habitu
sine notabili febre, depravatio.

O. I. MACIES.

II. INTUMESCENTIAE.

III. HYDROPS PARTIALES.

IV. TUBERA.

V. IMPETIGINES.

VI. ICTERITIAE.

VII. CACHEXIAE ANOMALÆ.

CL. IV. DOLORES,

Sensationes molestae ad febres non referendae.

O. I. DOLORES VAGI.

II. DOLORES CAPITIS.

III. DOLORES PECTORIS.

IV. DOLORES ABDOMINIS.

V. DOLORES EXTER-
NARUM.

CL. V. FLUXUS.

Exitus insolitus cujusvis solidi, vel fluidi,
e corpore est character hujus classis.

O. I. SANGUIFLUXUS.

II. ALVIFLUXUS sanguinolenti.

III. ALVIFLUXUS non sanguinolenti.

IV. SERIFLUXUS.

V. AERIFLUXUS.

CL. VI. SUPPRESSIONES.

Meatum impeditio, hinc excretionum con-
suetarum in sanitate retentio.

O. I. SUPPRESSIONES egerendorum.

II. SUPPRESSIONES ingerendorum.

III. SUPPRESSIONES imi ventris.

CL. VII. SPASMI.

Contractio invita constans, vel interpolata
muscularum motum localem efficientium.

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

II. SPASMI TONICI GENERALES.

III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

CL. VIII. ANHELATIONES.

Motus spasmodici iterati, defatigantes, pectoris cum respiratione sonora, molesta, absque pyrexia notabili.

O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

II. ANHELATIONES OPPRESSIVÆ.

CL. IX. DEBILITATES.

Impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque movendi more ad sanitatem necessario.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

II. ANEPITHYMIÆ.

III. DYSCINESIÆ.

IV. LEIPOPSYCHIÆ.

V. COMATA.

CL. X. EXANTHEMATA.

Febris cum efflorescentia cutis varia maculosa, pustulosa, phlyctenoidea, et asthenia.

O. I. EXANTHEMATA contagiosa

II. EXANTHEMATA non contagiosa.

CL. XI. PHLEGMASIAE.

Febris cum pulsu duro, dolore topico, inflammatione partis externae vel internae, sanguine missa crusta inflammatoria tecto, urina plus tincta.

- O. I. PHLEGMASIÆ musculosae.
- II. PHLEGMASIÆ membranaceae.
- III. PHLEGMASIÆ parenchymatosae,

CL. XII. F E B R E S.

Frigus, calor, pulsus frequens, respiratio aucta, viribus artuum imminutis, depravatis, vel viribus vitalibus pulsu et respiratione vix mutatis, virium artuum summa prostratio.

- O. I. FEBRES CONTINUÆ.
- II. FEBRES REMITTENTES.
- III. FEBRES INTERMITTENTES.

CL. XIII. VESANIAE.

Error mentis in imaginatione, appetitu, iudicio, aut memoria.

- O. I. HALLUCINATIONES.
- II. MOROSITATES.
- III. DELIRIA.
- IV. VESANIAE ANOMALÆ.

H h

C L A S S I S I.

ORDO I. MACULAE.

Mutationes coloris nativi.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula corneae pelluciditatem vitians, opacans.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymbosa cum cutis deprecatione, locum fixum non servans in quo nascatur.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae umbrinae glabrae, corymbosae, raro partes tectas affidentes, acquisitae.

G. IV. NÆVUS. 4

Macula congenita eminens, vel non, supra libellam cutis.

G. V. ECCHYMOA. 5

Est macula nigricans, vel atro-rubra, caerulea, livescens, in gilvum successive desinens colorem, nata a sanguine in adiposam sub cute effuso.

O. II. EFFLORESCENTIAE.

Aspredines, cum cuticulae elevatione ultra libellam cutis humorales, exiguae, gregales, absque pyrexia.

6 G. VI. P U S T U L A.

Phyma aut vesicula colorata suppurans, diametri linearis, fastigiata, pure dehiscens, quandoque in crustam abiens ; est seu *furunculus* linearis diametri.

7 G. VII. P A P U L A.

Phyma parvulum seu efflorescentia desquamanda, nec suppurans.

8 G. VIII. P H L Y C T H Æ N A.

Vesicula parva fluido seroso plena, quae inde sponte rumpitur et fundit serum.

9 G. IX. B A C C H I A.

Maculae rubrae, vel efflorescentiae nasi et partium adjacentium eidem, guttatae plus, minus prominentes, asperae, furfurascentes, diuturnae ; hoc genus ambigit inter maculas et efflorescentias.

G. X. VARUS.

10

Tumor pisi magnitudine plerumque sat durus, non suppurandus, aut desquamandus, pertinax in glandulis sebaceis. L.

G. XI. HERPES.

11

Papularum prurientium corymbus in squamas furfuraceas fatiscentium.

G. XII. EPINYCTIS.

12

Phlycthaenarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potissimum acriter prurientium.

G. XIII. HEMEROPATHOS.

13

Papulae rutilae crura obsidentes, extra lectum illico apparentes, importune pruriens, in lecto evanescentes, diurnae.

G. XIV. PSYDRACIA.

14

Efflorescentia erysipelatosa absque febre notabili.

G. XV. HYDROA.

15

Exanthemata granis milii magnitudine et forma similia subito exorta, phlycthaenoides, fugacia, absque asthenia, pyrexia, et

praegressa oppressione praecordiorum, miliaria multis habita.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales solitarii.

16 G. XVI. ERYTHEMA.

Phyma rubrum calens, diffusum, sine febre.

17 G. XVII. OEDEMA.

Phyma album, frigidum, indolens, molle
foveam ex pressione servans plerumque.

18 G. XVIII. EMPHYSEMA.

Phyma cuti concolor elasticum, ex pressione
aut percussione crepitans.

19 G. XIX. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum,
in partibus glandulosis enatum, dum exte-
rnum cuti quoque concolor observatur.

20 G. XX. INFLAMMATIO.

Est tumor sphaeroideus rubore, calore, ten-
sione, dolore pulsatili insignis, solitarius,

plerumque sat extensus, in suppurationem sponte vergens; erysipelas non suppurat, et phlegmone habet semper pyrexiam coniunctam manifestam; inflammatio saepius in phlegmone transit, vel phlegmone est gradus major inflammationis.

G. XXI. BUBO.

21

Phyma scirrhoso-phlegmonoideum in glandulis inguinalibus.

G. XXII. PAROTIS.

22

Tumor scirrhoso-phlegmonoideus parotidis glandulae, in suppurationem lentissime vergens.

G. XXIII. FURUNCULUS.

23

Tumor inflammatorius cutaneus, seu subcutaneus, prominens, profunde ruber, spheroideus, cuius centrum occupat vortex fibrosus digere nescius; ordinario juglandis habet magnitudinem.

G. XXIV. ANTHRAX.

24

Phyma apice gangraenosum, et in radio inflatum.

252 SYSTEMA MORBORUM

25 G. XXV. CANCER.

Phyma scirrhosum lacinans, vel phyma lacinans venis varicofis profunde rubris, nigris, lividis obsitum, cinctum, facile sanguinantibus.

26 G. XXVI. PARONYCHIA.

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore saepius perterebrante, calore, tensione, et subinde cum rubore.

27 G. XXVII. PHIMOSIS.

Tumor fere semper inflammatorius preputii glandem incarcerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis per succum nutritium copiosiorem advectum, &c. in hos conversum.

28 G. XXVIII. SARCOMA.

Excrecentia carnis consistentiam fere habens, plerumque rubra.

G. XXIX. CONDYLOMA.

29

Est excrementia eminens, vel non eminens, firmior carnibus et cute, mollior contra ossibus, non elastica.

G. XXX. VERRUCA.

30

Excrementia cutanea prominens, vix sensibilis, indolens, praerupta seu aspera superficie.

G. XXXI. PTERYGium.

31

Est excrementia carneâ, vel membranaceo-vasculosa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expansam utcunque referens, versusve corneam sese extendens, crescens.

G. XXXII. HORDEOLUM.

32

Tumor durus, aut excrementia plus, minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme sensu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine saepius granum hordei vel pisii aequans.

G. XXXIII. TRACHELOPHYMA.

33

Est tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticae partis colli.

34 G. XXXIV. EXOSTOSIS.

Tumor ossis partialis, vel aliquando totius ossis, ut subinde in minoribus fit, ad offa accedens.

O. V. CYSTIDES.

Tumores capsulati fluido referti.

35 G. XXXV. ANEURYSMA.

Cystis arteriosa crux referta, ex pulsu et situ noscenda.

36 G. XXXVI. VARIX.

Dilatatio venae rubra, nigrescens, ad pressionem recedens, iterumque subito rediens hac cessante, plerumque pruriens, mordicans.

37 G. XXXVII. MARISCA.

Tumor in margine ani, ex sanguine in tex- tum vasorum minimorum varicosorum ef- fuso efformatus, ruber, dolens, variae for- mae et magnitudinis. Vide Haemorrhoi- dem. L.

G. XXXVIII. HYDATIS. 38

Cystis lymphaeductuum dilatatorum, lym-
pham vel serum continens.

G. XXXIX. STAPHYLOMA. 39

Cystis corneae, ex dilatatione ejusdem, ecto-
pia uvae in cameram oculi anteriorem
prolapsae; hoc genus magis ad Ectopias
spectat. Vide Caliginem. L.

G. XL. LUPIA. 40

Est cystis materiem pultis, vel mellis consis-
tentiam referentem continens, haud pu-
rulentam, indolens, cuti concolor, loco mo-
bilis.

G. XLI. HYDARTHROS. 41

Hydrops vel in capsula articulari, vel in cellu-
lis vicinis, haud in tunica propria; tu-
mor est fluctuans sine coloris mutatione,
pulsatione.

G. XLII. APOSTEMA. 42

Cystis purulenta, vel ichorofo-purulenta;
noscitur ex fluctuatione, praegressa inflam-
matione, albedine, remissione doloris et
pulsationis.

256 SYSTEMA MORBORUM

43 G. XLIII. EXQMPHALUS.

Cystis umbilicalis, fluido quopiam repleta,
absque ectopia.

44 G. XLIV. OSCHEOPHYMA.

Cystis scroti variis fluidis turgens.

O. VI. ECTOPIAE.

Partium solidarum e sua sede dimotio, sensi-
bus obvia, continentibus has relaxatis.

45 G. XLV. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi.

46 G. XLVI. BLEPHAROPTOSIS.

Est palpebrae utriusque, vel alterutrius, mor-
bosa elongatio, retractio, intro vel extra
versio, cum symptomatis cuique ectopiac
propriis.

47 G. XLVII. HYPOSTAPHYLE.

Est procidentia seu elongatio uvulae relaxa-
tae, inflammatae, ulceratae, incrassatae,
attenuatae, vel bicornis.

48 G. XLVIII. PARAGLOSSA.

Est linguae magnitudo minuta, vel aucta;
vel plane soluto, aut elongato frenulo, in
fauces ejusdem revolutio.

G. XLIX. PROPTOMA.

49

Est procidentia appendicum externarum insolita et morbos, diversa a praedictis.

G. L. EXANIA.

50

Sphincteris ani, vel et intestini recti inversi procidentia extuberans, rubra, reducibilis semper extra strangulationem.

G. LI. EXOCYSTIS.

51

Vesicae inversa membrana interior, soluta a reliquis per urethram foras pendet, et exocystis !

G. LII. HYSTEROPTOSIS.

52

Est uteri procidentia tumorem sistens in vagina, vel quandoque extra genitalia pendentem, undique liberum, menses stillantem, saltem initio reponibilem, cum doloribus hypogastrii, inguinum, urinae difficultate, animi deliquiis; haec omnia tactus obstetricius definit.

G. LIII. COLPOPTOSIS.

53

Tumor in sinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur subinde una tantum ruga vaginae) per quod foramen digitus immissus altius

258 SYSTEMA MORBORUM

orificium uteri, uterumque in sua quasi sede absque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet insuper aegram dysuria, tenesmus.

54 G. LIV. GASTROCELE.

Est tumor in scrobiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus supra umbilicum insolitus, herniosus, ventriculum, aut alia viscera illapsa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorsali sponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum, undecunque orta natus, vomitum caussans.

55 G. LV. OMPHALOCELE.

Tumor herniosus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione integumentorum et peritonaei natus, varia viscera continens.

56 G. LVI. LAPAROCELE.

Tumor herniosus, ventralis seu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

57 G. LVII. MEROCELE.

Tumor herniosus, in suprema et anteriore parte femoris, ad exitum vasorum cruralium

in foeminis praecipue observabilis, proprietates herniarum habens ; vidi merocelem etiam in viro.

G. LVIII. BUBONOCELE.

58

Tumor herniosus emergens per annulum vasorum spermaticorum, sensim enatus, cuti concolor et indolens, absente strangulatione.

G. LIX. OPODEOCELE.

59

Est tumor herniosus in summo femine adlatus, genitalium egrediens per sinuositatem ossis ischii superiorem, vasis transmittendis dicatam ; in foeminis prope alterum vulvae labium visitur haec ectopia ; reponibilis, cuti concolor, mollis ; dum parvus est tumor, vix observatur, subin est elasticus.

T. I. Auctorum chirurgicorum Paris. p. 709. consule L.

G. LX. ISCHIOCELE.

60

Est hernia emergens per incisuram ossis sacri, seu hiatum inter os sacrum et tuber ossis ischii, decubitu prone reponibilis ; rarum genus, et sat adhuc obscurum.

61 G. LXI. COLPOCELE.

Est tumor herniosus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu supino natibus elevatis sponte recedens plerumque, indolens, absque signis aliorum tumorum qui hic enasci solent.

62 G. LXII. PERINÆOCELE.

Tumor herniosus in perinaeo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; subin est effectus dystociae; species hujus generis vesicalis, intestinalis, omentalnis, patent una cum therapeia ex prioribus.

63 G. LXIII. PERITONÆORIXIS.

Sunt herniae omnes jam descriptae ob rup turam peritonaei natae; rixis vero peritonaei signa sunt, crepitus in violentia aliqua majore peritonaeum lacerante, herniae alicujus subita et magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor; species sunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia est extensio praeternaturalis peritonaei et integumentorum cavum formans;

recipiens viscera adjacentia; praeter praedictas hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniae partiales intestinales, ubi media pars fistulae intestinalis cavum herniosum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniae accretae, in quo casu pars illapsa cavi herniosi peritonaeo accrescit; cavum herniosum quandoque praeter viscera illapsa liquorem in abdomine collectum continet; saepius quoque partes cavum herniosum ingressae incarcerantur a spastice contracto annulo, unde ileus nascitur, quem vide suo loco. Peritonaeorixis pertinet quidem ad rupturam; sed, propter affinitatem ejusdem cum herniis, hic eandem subjunxi.

G. LXIV. ENCEPHALOCELE.

64

Est cerebri, aut cerebelli, vel utriusque simul, per hiatus ossium cranii necdum sat cohaerentium, ectopia herniosa, relaxata pariter lamina utraque durae matris et piae externa tenuissima pellucida; symptoma- ta subin non magna, subin contra gravif- sima caussans.

K k

65 G. LXV. HYSTEROLOXIA.

Est uteri gravidí, vel non grávidí, in abdómine situs seu directio aberrans a directiōne naturali axeos suae, nescenda ex orifice uterini directione mutata, palpo extérno abdominis, tum aliis symptomatis inconsuetis; ut icchuria, dysuria, enuresi, obſtipatione, &c.

66 G. LXVI. PARORCHIDIUM.

Est testiculi unius, vel utriusque, a situ naturali aberratio.

67 G. LXVII. EXARTHREMA.

Est separatio contigui in ossium articulis per diarthroſin combinatorum, nescenda ex impotentia ad motum, mutatione nativae conformatiōnis, dolore, protuberantia insolita, cavitate, musculorum tensione, conversione artus, accurtatione membra, vel prolongatione.

68 G. LXVIII. DIASTASIS.

Oſſium recessus junctorum per raphen, harmoniam, synchondroſin, aut syndesmoſin, cognoscibilis cavitate insolita uno in loco, in altero vero tumore, mutatione positu-

rae, et reliquis symptomatis oculo et tactui patentibus.

G. LXIX. LOXARTHROS.

69

Est ossium articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, seu obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmum: Vide Subluxationem et Distorsionem.

G. LXX. GIBBOSITAS.

70

Est ossium pectus, vel pelvum componentium indecora prominentia a tumore, luxatione, diaftasi, torsione, pressione, aut alio principio nata.

G. LXXI. LORDOSIS.

71

Ossium longiorum fistulosorum circa medium inflexio, incurvatio, ectopia a linea recta.

O. VII. DEFORMITATES

Sunt vitia quae vix sanitatem laedunt.

G. LXXII. LAGOSTOMA.

72

Labium oris fissum.

264 SYSTEMA MORBORUM

73 G. LXXIII. APELLA.

Est praeputii, vel alterius appendicis mollis,
brevitas, parvitas.

74 G. LXXIV. POLYMERISMA.

Partium numerum ordinarium excessus.

75 G. LXXV. EPIDOSIS.

Appendicum mollium incrementum inconsuetum sanum : Species sunt penes praelongi, auriculae pendentes, praeputia longissima, clitorismus, caro pubis foeminarum Africanarum, nasones, labia tumida oris, &c.

76 G. LXXVI. ANCHYLOMERISMA.

Est partium concretio.

77 G. LXXVII. HIRSUTIES.

Pili copiosiores, longiores, vel in locis ubi non solent crescere obvii, dant ideam hujus generis.

C L A S S I S II.

P L A G Æ.

C H A R . C L A S S I S . Continui solutiones, morbi proprie chirurgici persaepe sat graves.

O R D O I . S O L U T I O N E S

Recentes, quasi semper cruentae.

G. I. V U L N U S .

78

Est continui solutio molli in parte hians, labiata, cruenta, ab instrumento mechanico scindente facta ; corneae vulnus cruem non fundit.

G. II. P U N C T U R A .

79

Continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente facta casualiter.

G. III. S C L O P E T O P L A G A .

80

Est vulnus a glandibus e bombardis, aut sclopeticis explosionis illatum, vaginatum, decursum glandis designans, oblongum, vexatum.

G. IV. M O R S U S .

81

Est plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mordendo.

82 G. V. EXCORIATIO.

Est epidermidis a cute, vel cutis a carnibus separatio, detractio.

83 G. VI. CONTUSIO.

Est partis cujuscunque mollis, vel solidae, in minimis vasculis, fibris attritio, fractio, solutio.

84 G. VII. RUPTURA.

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialysis per tensionem facta, vires horum excedentem: Consule chirurgos et de utero rupto Cl. Henricum Crantz, ingenii excitatissimi virum; huc pertinet peritonaeoris.

O. II. SOLUTIONES

Recentes, cruentae, et artificiales.

85 G. VIII. OPERATIO.

Est studiosa solutio continui ad aliquid exigendum, ut lithotomia; operatio reipsa est vulnus studiosa et dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus clavis.

G. IX. AMPUTATIO. 86

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

G. X. SUTURA. 87

Est, studiosis puncturis mediante acu factis,
filisque per puncturas trajectis, solutorum mollium contractio, adductio; futura siccata fit emplastris, quae huc non spectat, quum non sit plaga.

G. XI. PARACENTESIS. 88

Est artificialis punctura in aliquod cavum corporis, plerumque acu triquetra cannulata facta.

O. III. SOLUTIONES

Incruentae, nec ad priores referendae, pus, faniem, cariem, &c. sistentes.

G. XII. ULCUS. 89

Est vulnus suppuratum partis mollis, vel solutio continui mollis antiqua, pus, ichorem, aut faniem quamcumque alens, fundens.

90 G. XIII. EXULCERATIO.

Est excoriatio suppurans, seu ulcus superfici-
ale, reliqua, quae ad hoc genus spectare
videntur, ex ulcere patent.

91 G. XIV. FISTULA.

Est ulcus cortice calloso vaginatum, ore an-
gustum, oblongum.

92 G. XV. SINUS.

Est cavitas ulcerosa ampla, saepe multiplex,
ore angusto non calloso, vel plane nullo
donata.

93 G. XVI. ESCHARA.

Crusta mortua sicca partis mollis saepius
causticis facta est eschara, sensus et vitae
expers.

94 G. XVII. C A R I E S.

Ossis erosio cava, aspera, periostio denudata,
plerumque nigra; unde os evadit fragile,
friabile, vel exfoliabile: Species numerat
hoc genus sequentes; est nimirum caries
sicca, humida, exfoliabilis, syphilitica,
scorbutica, scrophulosa, variolosa.

G. XVIII. ARTHROOCACE.

95

Ulcus medullae ab interioribus sponte natum, cum ossis carie, exostosi, et persaepe dolore; species numerat hoc genus fere totidem quot caries; vulgo vocatur spina ventosa: Consule super hac Petit de morbis ossium.

O. IV. SOLUTIONES

Anomalae, quae prioribus includi renuunt.

G. XIX. RHAGAS.

96

Est solutio continui sicca in partium mollium marginibus, ut labiis oris; species includit Rhagas venereum, malignam, pestiferam, frambesiacam, ulcerosam, benignam, lixivialem, glacialem, &c.

G. XX. AMBUSTIO.

97

Est plaga a flamma ignis, corporibusque ex igne carentibus, liquidis ferventibus, aut radiis solis in focum coactis, nostro corpori illata, succendentibus phaenigmo, phlycthaenis, vel eschara.

270 SYSTEMA MORBORUM

98 G. XXI. FRACTURA.

Est divisio ossium in fragmenta separabilia.

99 G. XXII. FISSURA.

Divisio ossium rimam referens, haecceve
non penitus separans.

C L A S S I S III.

O. I. MACIES.

Diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.

G. I. TABES.

100

Est macilentia universalis, cum pyrexia lenta et habituali, citra tussim purisve anacatharsin.

G. II. PHTHISIS.

101

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et ut plurimum puris sputo: Ab initio rarius in phthisi adest puris sputum, in Statu contra et fine semper. Quid est proprie pus?

G. III. ATROPHIA.

102

Est macies sine tussi, anacatharsi, et febre notabili; raro equidem est atrophia sine omni febricula. Consule definitionem febris.

G. IV. H A E M A T A P O R I A.

103

Macies seu cachexia ex inopia sanguinis. Descriptio: Virium debilitas, pertinax au-

rium sibilus, anorexia, facies lurida, epide-
lio tecta, pallidissima, alvi fluxus, diabetes,
sudores profusi, lipothymiae, tibiae tumi-
dae, iubin hydrothorax his succedens, vi-
giliae, suspiria, animi abjectio, moeror, mor-
tis timor, urina pallida, venae abditae, pul-
sus vacuus, sanguinis profluvia praegressa,
sunt signa haematoporiae; aliquando
aër evolutus locum sanguinis in vasis occu-
pat.

104 G. V. ARIDURA.

Macies, exsiccatio unius tantum artus, vel
partis corporis, sine febre.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

105 G. VI. PLETHORA.

Intumescencia universalis, proportionata et
aequabilis, ex abundantia sanguinis. De-
scriptio: Amystidis et ventris cultus, pul-
sus plenus aut suppressus, venarum am-
plitudo conspicua: Aestus et gravitas to-
tius corporis, respirandi difficultas, lassitu-

do spontanea, stupor artuum, somni turbati, partes epidelio tectae ruberrimae, temperamentum sublaxum, sanguineum.

G. VII. POLYSARCIA.

106

Intumescentia universalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

G. VIII. PNEUMATOSIS.

107

Intumescentia universalis ab aëre, ad attac-
tum crepitans, elastica, levis.

G. IX. ANASARCA.

108

Intumescentia universalis oedematosæ, non
elastica, vestigium digitæ impressi servans,
pallida, frigida, haud crepitans.

G. X. PHLEGMATIA.

109

Intumescentia oedematosæ artuum inferiorum
mollis, cuti concolor, indolens, foveam
digitæ impressi servans, non elastica.

G. XI. PHYSCONIA.

110

Est intumescentia abdominis a partibus solidis praeternaturalis, sine graviditate, fluctuatione, et elasti, ad tactum dura, resistens, parenchymatica.

III G. XII. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ex imo hypogastrio incipiens, in axique ejusdem ascendens, opus generationis subsequens, partu terminanda; pathemata gravidarum, menostasia, mutationes oris tincae, motus infantis sensibilis, sunt totidem characteres hujus generis.

O. III. HYDROPS PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congestis, ut abdomine, &c.

III G. XIII. HYDROCEPHALUS.

Hydrops capitis a fero.

III G. XIV. PHYSOCEPHALUS.

Est tumor totius capitis emphysematosus elasticus, sub digito premente crepitans.

III G. XV. HYDORACHITIS.

Tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo spina bifida, in recens natis protuberans cum anaesthesia; est verus hydrops thecae spinalis. A.

G. XVI. ASCITES.

115

Gravis, sphaeroidea, et fluctuosa abdominis intumescentia, non elastica, cum polydipsia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

G. XVII. HYDROMETRA.

116

Tumor hypogastrii sine graviditate, ab uto-
ro fluidis distento, rotundus, fluctuans,
leges gravitatis sequens ; dolor inguinum,
spirandi difficultas, menostasia, rigores,
mammarum mollities, phlegmatia, et tac-
tus orificii uterini, diagnosin firmant.

G. XVIII. PHYSOMETRA.

117

Est constans tumor hypogastrii a flatu ute-
rum distendente, rotundus, elasticus, levis,
in sede uteri.

G. XIX. T Y M P A N I T E S.

118

Est intumescentia totius abdominis, levis et
elastica, a pulsatione sonum edens, cum
ructibus, borborygmis, constipatione, et do-
loribus abdominis ; chronicus est hic mor-
bus.

119 G. XX. METEORISMUS.

Est intumescientia flatulenta epigastrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax et plerumque indolens.

O. IV. T U B E R A.

Tumores partium solidarum externi, non hydropici, cachexia,

120 G. XXI. R A C H I T I S.

Est deformitas nata ex articulorum tumore duro, carnium marcore et flacciditate, capitis mole, sterni protuberantia; ingenium praecox in infantibus, ossiumve flexilitas et lordosis.

121 G. XXII. SCROPHULA.

Tumores subscirrhoti glandularum colli, mesenteriive, cum labiis nafoque crassioribus; scrophula ordinario mollior est schirro.

122 G. XXIII. CARCINOMA.

Ulceræ cancerosa, sordida, labiis duris eversis, scirrhotis, ex quibus ichor manat acris et rodens; adsunt insuper dolores lancinan-

tes, excrescentiae fungosae, venae adjacentes varicosae non incepit pedes cancri referentes, et febris hecūca.

G. XXIV. LEONTIASIS.

123

Cognoscitur ex mutatione formae humanae in ferinam aliquatenus; unde aspectus hominis ferinus.

G. XXV. MALIS.

124

Morbus est, qui cognoscitur tumoribus, ulceribus, quae infecta vermiformia vel horum larvae excitarunt, in quibus nidulantur, et ex apertis prodeunt.

G. XXVI. FRAMBÆSIA.

125

Morbus contagiosus, aliquando et congenitus apud Americanos, cuius præcipuum symptomum sunt excrescentiae fungosae mori fructus referentes, quibus sese adjungunt ulcera dysepulota, exostoses, caries, anchylites, et macies.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi contagiosi, chronicci, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes,

crustas, inducunt, plures foventur a viru
inoculabili.

126 G. XXVII. SYPHILIS.

Ulcuscula, porri, ficus, bubones, tophi, nodi,
post vel cum gonorrhoea plerumque; de-
in pustulae crustosae, dolores nocturni, o-
stocopi, exostoses, caries, macies, et color
luridus, morbum adesse loquuntur.

127 G. XXVIII. SCORBUTUS.

Cognoscitur ex maculis lividis, flavis, coeru-
leis tibiarum, stomachace, facie lurida, uri-
na pellicula tecta.

128 G. XXIX. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis, tubera callosa, ozaena, rau-
cedo, cutis elephantina crassa et unctuosa,
richtus satyrorum, anaesthesia in artibus,
constituunt characterem hujus generis.

129 G. XXX. LEPROSA.

Cognoscitur ex pustulis verrucosis, duris,
crassis, herpetosis, vel squamis siccis in co-
rymbos dispositis, prurientibus, escharoti-
cisis, rhagadibus; dum plures sunt siccæ
pustulae, *sicca*; ubi vero, e contra, plures

humidae et exulceratae, *humida* dicitur le-
pra.

G. XXXI. S C A B I E S.

130

Cognoscitur ex pustulis, vel phlycthaenis, len-
tis vel fecalis grani magnitudine, lym-
pham aut saniem continentibus, quae
scalpendo ruptae crustas prurientes for-
mant; contagiosus hic morbus et inocu-
labilis flexuras artuum maxime occupat.

G. XXXII. T I N E A.

131

Incipit a pustulis vel phlycthaenis capitis aut
faciei diversi-coloribus, quae ruptae in
crustas humidas vel siccas abeunt corym-
bosae; videtur nimirum esse scabies capi-
tis, et nihil aliud.

O. VI. I C T E R I T I A E.

Cognoscuntur ex totius cutis colore inassue-
to, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido sine
pyrexia notabili.

G. XXXIII. A U R I G O.

132

Flavedo cutis ad aureum, vel aurantium ten-

dens colorem, praecipue vero scleroticae membranae.

133 G. XXXIV. MELASICTERUS.

Color cutis et scleroticae niger, atro-lividus, fuliginosus, constituunt characterem hujus generis, cum moestitia et perturbatione mentis.

134 G. XXXV. PHOENIGMUS.

Morbus hicce apyretus rubedine cutis diffusa maculata, vel punctata, notatur.

135 G. XXXVI. CHLOROSIS.

Pallor faciei totiusve corporis, cum asthenia, et saepius pica, sine aurigne scleroticae; color est albus, cinereus, fuscus, cereus, luridus, aut virescens, cum sclerotica semper albissima perseverante.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noscuntur ex signis classeos et affinitate cum prioribus generibus.

G. XXXVII. PHTHIRIASIS.

136

Exortus infectorum, pediculorum, aut his
affinium, cum porrigine, exulceratione,
pruritu, cachexia.

G. XXXVIII. TRICHOMA.

137

Morbus contagiosus Hebraeorum, cuius prae-
cipuum symptoma est capillorum conspur-
catio, complicatio, conglutinatio, et in cir-
ros ac funiculos concretio inextricabilis,
saepius cum phthiriasi ; haereditarius est
morbus hicce.

G. XXXIX. ALOPECIA.

138

Defluvium pilorum et desquamatio cuticu-
lae constituunt characterem hujus morbi,
cunctis animantibus communis.

G. XL. ELCOSIS.

139

Copiosa ampla ulcera, foetida, cariosa, chro-
nica, cum pyrexia lenta, produnt hoc
genus.

G. XLI. GANGRÆNA.

140

Anaesthesia, immobilitas, frigus, phlycthae-
nae lympham continentes, flacciditas, li-
viditas, et partis mors in cute et membrana

cellulosa, vel in omnibus ad ossa usque, textus facilis laceratio et dissolutio putrida, cum foetore cadaverofo, definiunt hoc genus.

141 G. XLII. NECROSIS.

Est partis mors lenta sine praevio tumore, mollitie, et dissolutione foetida, cum dolore ardente ordinario et stupore, quae sequitur exsiccatio partis, induratio, nigredo, et mumia; differt a gangraena in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente et stupore, et in mumiam abeat; gangraena contra mollescat, phlycthaenas elevet, putrefescat, foeteat, atque cito decurrat.

C L A S S I S. IV.

Ingrata et molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

O. I. D O L O R E S V A G I.

Saepius universales, aut cutanei ad phlegmasias non referendi.

G.I. A R T H R I T I S.

142

Articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

G. II. O S T O C O P U S.

143

Est dolor constans et notabilis ossium, a periostio interno potissimum affecto, ex professione non exacerbans, fixus.

G. III. R H E U M A T I S M U S.

144

Dolor diuturnus in parte carnosa, tendinosa artuum, vagabundus, saepius sine coryza, rheumate, catarrho, erysipelate, et sine febre notabili; acutus rheumatismus facit genus inter phlegmasias *Myofitin* a me dictum; sanguis missus rheumatismo la-

borantium est gelatinosa crusta tectus, et urina saepe ad sulphureum colorem accedit.

145 G. IV. CATARRHUS.

Colli colloque vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, levi partium intumescentia, et pyrexia vespertina exigua, seu amphimerina catarrhali.

146 G. V. ANXIETAS.

Molestia ad loci mutationem assiduam cogens aegrum, quem habet.

147 G. V. LASSITUDO.

Est ingrata sensatio, juncta cum debilitate, quae ad quietem cogit virium reparandorum gratia.

148 G. VII. STUPOR.

Est molesta sensatio cum obscuritate tactus.

149 G. VIII. PRURITUS.

Molesta sensatio ad scalpendum cogens.

150 G. IX. ALGOR.

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur, jam cum phricasmo, rigore, vel concusione corporis, jam sine his symptomatisbus.

G. X. ARDOR.

151

Molestia qualis a summo aëris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

G. XI. CEPHALALGIA.

152

Est capitidis gravitas vel sensatio molesta, quae refert caput interius distensum, turgidum, et quasi gravatum, malum haud chronicum.

G. XII. CEPHALÆA.

153

Est dolor capitidis chronicus, et, juxta Stahlianos, tensivus; videtur sola diurnitate a cephalalgia differre receptissimum hoc genus.

G. XIII. HEMICRANIA.

154

Est morbus, cuius praecipuum symptoma est dolor in alterutro capitidis latere, potissimum ad tempora, frontem, ac oculos, isque vehemens saepe et periodicus quandoque.

N n.

155 G. XIV. OPHTHALMIA.

Cognoscitur ex oculi dolore, rubore, intollerantia lucis, et lacrymatione, vel siccitate.

156 G. XV. OTALGIA.

Dolor in aure.

157 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium maxillarumque, cum vigilius et saepius ptyalismo, maxillae aut genarum tumore.

O. III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

158 G. XVII. PYROSIS.

Ardor aësophagi ad ventriculum usque extensus, sine febre, vulgo Soda dicitur.

159 G. XVIII. CARDIOPMUS.

Est gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis auctaeve molis et pulsatione, quae ad minimum motum augentur: Aneurysmati cordis, auricularum, sinuum, et arteriarum tribuitur cardiopmus, seu dolor cordis.

O. IV. D O L O R E S A B D O- M I N I S

Interni.

G. XIX. C A R D I A L G I A.

160

Molestia ad epigastrium et ventriculum re-
lata, syncopen minitans.

G. XX. G A S T R O D Y N I A.

161

Notabilis et durans in regione ventriculi do-
lor, sine syncope et pyrexia.

G. XXI. C O L I C A.

162

Est dolor potissimum intestini crassi regiones
occupans in abdomine, hujusque officia
turbans, sine febre notabili, cum pulsu ple-
rumque suppresso, rariore, et obstipatione.

G. XXII. H E P A T A L G I A.

163

Molesta sensatio gravativa, tensiva, aut quae-
vis alia in regione hepatis, sine pyrexia acu-
ta.

G. XXIII. S P L E N A L G I A.

164

Est dolor pertinax gravativus, tensivus, in re-
gione lienis, cum aliquali dyspnoea, pul-

su in inspiratione intermittente, tumore et
duritie, sine pyrexia.

165 G. XXIV. NEPHRALGIA.

Dolor fixus in regione renum et ureterum,
sine pyrexia acuta.

166 G. XXV. HYSTERALGIA.

Dolor in regione uteri, sine parturitionis nisu
et phlegmasia notabili.

O. V. D O L O R E S E X T E R - N A R U M

Partium locales.

167 G. XXVI. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

168 G. XXVII. RACHIALGIA.

Atroces dolores abdominis, ad lumbos et dor-
sum serpentes, pressione non crescentes,
cum umbilici subin retractione, alvi con-
stipatione, convulsione, manuum torpore,
paresi, paralyysi, ac contracturis artuum,
definiunt hunc morbum.

G. XXVIII. L U M B A G O .

169

Est dolor lumborum corporis erectionem impediens, sine nausea, ureterum dolore, femoris stupore, urinaeve vitiis ; dolor est in musculis spinae dorsi aut ligamentis.

G. XXIX. I S C H I A S .

170

Dolor constans coxendicis, pelvis, et capitis femoris, nec non muscularum ejusdem ; hinc difficultas gradiendi, standi, claudicatio, frigus partis ; conatus ad deponendam alvum dolorem augent ischiadicum.

G. XXX. P R O C T A L G I A .

171

Est dolor podicis.

G. XXX. P U D E N D A G R A .

172

Dolor partium genitalium tum in viris tum in foeminis.

G. XXXII. D I G I T I U M .

173

Est dolor periodicus articuli cuiusdem digiti, cum emaciatione et ossis friabilitate, sine omni phlegmasia. Vide Ill. De Sauvages, T. I. p. 150.

C L A S S I S V.
F L U X U S.

CHAR. CLASSIS. Exitus insolitus cujusvis fluidi vel solidi e corpore.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel saltem sanguinolentae materiae ejactio seu effluxus, quacunque via, praeter alvinam.

174 G. I. HAEMORRHAGIA.

Est fluxus sanguinis e naribus.

175 G. II. HAEMOPTYSIS.

Est sanguinis expectatio seu anacatharsis, cum tussi sine notabili pyrexia.

176 G. III. STOMACACE.

Stomacace laborantibus sanguis dissolutus promanat e gingivis laxis, folidis, et foetidis, sponte, vel ad levem harum attactum.

177 G. IV. HÆMATEMESIS.

Est sanguinis rejectio ex oesophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, et animi deliquiis ; observantur et faeces alvi sanguine tinctae, nigricantes.

G. V. HÆMATURIA.

178

Est effluxus seu minctio cruoris, urinae cruentae ex vesica, vel feminis sanguinolenti ex urethra, in viris et mulieribus.

G. VI. METRORRHAGIA.

179

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morbosus, nimius.

G. VII. ABORTUS.

180

Est foetus immaturi, id est, ante nonum mensem graviditatis saltem aliquot septimanis exclusio, subin cum metrorrhagia: Symptoma sunt, laffitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hysteralgia, lipothymia, &c.

O. II. ALVIFLUXUS

Sanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHOEA.

181

Est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS.

182

Est sanguifluxus ex tuberculis, mariscis rubris, duris, dolorificis, finem intestini recti

obsidentibus, vel in recto latentibus; sentiunt posteriora tubercula aegri in recto saepius obslipati, et digitus immissus intestino haec offendit; sanguis in depositione alvi praecedit, vel ad minus comitatur, excrementa.

183 G. X. DYSENTERIA.

Est frequens torminosa mucoso-cruenta alvi dejectio.

184 G. XI. MELÆNA.

Est Fluxus materiei nigricantis, atro-rubrae, ano vel cato frequens.

O. III. ALVIFLUXUS
Non sanguinolenti.

185 G. XII. NAUSEA.

Est inanis vomendi conatus, et tamen maximis licet nisibus nihil nisi flatus aut mucus exiguum exantlatur; adeo anorexia, gastrodynbia, motus ossis hyoidis ad superiora, ptyalismus; capitum ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

G. XIII. VOMITUS.

186

Est palpabilium materierum non cruentarum per os oesophagumque rejectio frequens ex ventriculo; causa est antiperistaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis et muscularum abdominallium pressione, cum simultanea expiratione; pulsus est contractus, rigidus, et frequens.

G. XIV. ILEUS.

187

Gastrodynia, obstipatio, anxietas, et vomitus demum faeculentae materiae, determinant hunc morbum; atrocia circa umbilicum tormina, ructus, nausea, singultus, intestinorum volutatio, virium prostratio, pertinax alvi obstipatio, et vomitus demum faeculentus, sunt symptomata principalia hujus morbi.

G. XV. CHOLERA.

188

Est syndrome ex vomitu, diarrhoea, gastrodynia, prostratione virium, et subin suratum crampo.

G. XVI. DIARRHOEA.

189

Est recrementorum et exrementorum ut plurimum fluxilium frequens per anum
Oo

dejectio notabilis et constans, adeoque morbos.

190 G. XVII. COELIACA.

Est albescens, aut chyliacearum materierum per alvum frequens dejectio, plerumque profusa, cum terminibus et prostratione virium.

191 G. XVIII. LIENTERIA.

Alimenta parum aut nihil mutata per alvum dejiciunt, et quidem plerumque paulo post ingestionem, lienterici.

192 G. XIX. TENESMUS.

Muci frequens et pauca dejectio per anum, cum intensa dejiciendi cupiditate, conatusque eidem proportionali; stimulum et dolorem sentiunt aegri in intestino recto.

193 G. XX. PROCTORRHOEA.

Est fluxus mucosi subalbi, flavescentis, quandoque striis sanguineis tincti, humoris ex vasis haemorrhoidalibus externis, vel in recto latitantibus, qui humor ordinario spissior est, dum ex internis vasibus stillat, scybalaque praecedit: Vide Lieutaud, T. 1. p. 396. No. 4. Pruritum praeterea et

ardorem hoc fluore madentes et foetentes in podice sentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi possunt esse proctorrhœa externa, interna, periodica, sanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctoleucorrhœa vocari possit, ob similitudinem cum leucorrhœa.

O. IV. SERIFLUXUS.

Fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum, effluxus morbosi.

G. XXI. EPHIDROSIS.

194

Est sudoris quantitate, qualitate, aut intempestivitate peccantis, excedentis effluxus.

G. XXII. EPIPHORA.

195

Est oculis constans effluxus humoris serosi, lacrymalis, sebacei, aut purulenti, morbosus.

G. XXIII. CORYZA.

196

Est humoris serosi mucosive e naribus fluxus morbosus, sine, vel cum ozaena, concomitante plerumque gravedine capitis.

296 SYSTEMA MORBORUM

297 G. XXIV. PTYALISMUS.

Est salivae mucive, sine anacatharsī ac vomitione, ex ore effluxus, emissio, aut sputatio uber et constans.

198 G. XXV. ANACATHARSIS.

Est muci, lymphae, aut puris facta cum tussi e pectore per os rejectio frequens, notabilis, et morbosa.

199 G. XXVI. DIABETES.

Subita potus omnis per urinae vias emissio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profusio, cum siti, anorexia, et polydipsia.

200 G. XXVII. ENURESIS.

Involuntaria et inopportuna doloris et ardoris expers minctio, quaeque saepius insciis accidit.

201 G. XXVIII. PYURIA.

Est purulentae, albae, flavae, mucosae, aut lutulentae materiae cum urinis minctio.

202 G. XXIX. LEUCORRHOEA.

Est serosae, flavae, puriformis, mucosae, foetidae, atrae, &c. materiae ex utero aut vagina delapsus, effluxusve morbosus,

G. XXX. LOCHI ORRHOEA.

203

Est lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

G. XXXI. GONORRHOEA.

204

Est stillicidium fluidi seminalis, vel puriformis, ex urethra, sine minctione.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA.

205

Est stillicidium lactis e mammis, vel locis insolitis.

G. XXXIII. OTORRHOEA.

206

Est fluxus serosus, purulentus, foetidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculae.

O. V. AERIFLUXUS,

Sunt flatus halitusve insolitae et vitiosae emissiones per os vel anum, &c.

G. XXXIV. FLATULENTIA.

207

Est morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emmissione et borborygmis designatus.

298 SYSTEMA MORBORUM

208 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Est flatuum ex vesica per urethram, vel ex utero per vaginam, emissio.

209 G. XXXVI. DYSODIA.

Est foetidorum vaporum e corpore exhalatio odoratum offendens, exhalant tales vapes e naribus, ore, vulva, inguinibus, axillis, et pedibus,

C L A S S I S VI.

CHAR. CLASSIS. Meatuum impeditio; hinc solitarum in sanitate excretionum impedimentum et emanatio; *Suppressorios* morbos vocavit Ill. Linnaeus.

ORDO I. SUPPRESSIONES

Humorum seroforum.

G. I. ADIAPNEUSTIA. 210

Transpirationis naturalis, et liquoris cutis organa humectantis, suppressio.

G. II. STERILITAS. 211

Est geniturae suppressio, conceptus impedatio.

G. III. ISCHURIA. 212

Urinae secretae a renibus retentio seu suppressio, cum tumore hypogastrii, vel secretionis in rénibus suppressio, cum stupore renum, singultu, anorexia, vomitu, ptyalismo urinoso, ephridrofi.

G. IV. DYSURIA. 213

Difficilis et dolorifica, guttata saepius et ardens mictio; est ergo fluxus urinae pro parte suppressus, et non in integrum, ut in ischuria.

214 G. V. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

215 G. VI. DYSLOCHIA.

Est lochiorum suppressio.

O. II. SUPPRESSIONES
INGERENDORUM,

Constrictio meatuum ingerenda admittenti-
um, sine phlegmasia.

216 G. VII. DYSPHAGIA.

Est deglutitionis suppressio, impeditio, absque
notabili respirationis laesione et phlegma-
sia.

217 G. VIII. ANGINA.

Est respiratio impedita, cum sensu obicis in
gutture, absque phlegmasia, sive dein adsit
dysphagia, sive non.

O. III. SUPPRESSIONES

Imi ventris.

218 G. IX. DYSMENORRHQEA.

Menstrua suppressa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyspnoea, palpitatione cordis, &c. constituunt characterem hujus generis; fluxus menstruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari solet; quantitas sanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur; circa 13 annum aetatis incipit, et ad 45 plerumque producitur; sanguis refert sanguinem victimae.

219 G. X. DYSTOCIA.

Dolorifica, laboriosa ultra modum foetus exclusio aut secundinarum, vel penitus impossibilis.

220 G. XI. DYSHAEMORRHOIS.

Est suppressio suetarum haemorrhoidum; dum fluxus haemorrhoidum suetarum periodicus saepius supprimitur, ex quacunque

P p

occasione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons sponte siccari solet; oriuntur lumbago, ischias, vertigo, cephalalgia, tensio cervicis, anxietas, dyspnoea, colica, &c. Haemorrhoidum fluxus, qui ultra 65. annum aetatis protelatur, jam morbosus haberi debet et supprimi minuive; senectus enim hunc fluxum non fert. Haemorrhoides rarissime cum constantia sanitatis observatur; hinc vix pro beneficio haberi potest, licet morbos graviores prævertere dicatur.

221 G. XII. OBSTIPATIO.

Faecum alvi exoneratio impedita. Carolus *Linnaeus*; est nimurum segnis, difficilis, rara faecum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici possunt excrementa: Medici assiduo curant obstitutionem, et tamen hanc nec in numero morborum tolerant; ecquidem raro est morbus per se, saepissime vero symptoma hoc alias morbos comitatur et auget.

C L A S S I S VII. S P A S M I.

CHAR. CLASSIS. Contractio constans, vel interpolata, muscularum motum localem efficientium, eaque invita.

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

G. I. STRABISMUS.

222

Oculi alterutrius spasmodus, tonicus axium opticorum divergentiam, vel convergentiam nimiam inferens ; seu est spasmodus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unum objectum non convergit.

G. II. TRISMUS.

223

Est spastica contractio tonica, aliquando visa fuit solum clonica maxillae inferioris, vulgo *trotura oris* dicitur ; rusticus venerat ad me pedes trismo tonico laborans pro consilio, contra hunc morbum ; datur

igitur solitarius hicce morbus; vide *textum.*

224 G. III. OBSTIPITAS.

Est colli spasmus, vulgo dicitur *torticollis,* tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem et directionem mutans.

225 G. IV. CONTRACTURA.

Est artus unius vel plurium constans, diuturna rigiditas, inflexilitas.

226 G. V. CRAMPUS.

Est subitanea, fugax, et dolorifica musculi rigiditas, cum dolore subin atroci.

227 G. VI. PRIAPISMUS.

Est penis ingrata et sine appetitu libidinis rigiditas seu, erek^tio.

**O. II. SPASMI TONICI
GENERALES.**

228 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis tonicus subito ortus, cum dyspnoea; rigent musculi omnes, et corpus inflexible servant, cum dyspnoea et ru-

bore faciei; vel rigent musculi soli posteriores corporis, aut anteriores, et corpus flectunt horribiliter, et plerumque flexum servant diutius.

G. VIII. CATOCHUS.

229

Spasmus generalis tonicus sensim factus, sine dyspnœa, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

**O. III. SPASMI CLONICI
PARTIALES.**

Agitatio invita et coacta cujusdem organi aut artus, cuius motivum ab aegro non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS.

230

Spasmus clonicus oculi, vel palpebrae.

G. X. CARPHOLOGIA.

231

Est spasmus clonicus manuum, quo aegri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muscas venantur; symptoma hoc a suffusione natum plerumque est lethale.

232 G. XI. SUBSULTUS.

Est motus palpitans aut tremulus tendinum,
pone carpos potissimum observabilis.

233 G. XII. PANDICULATIO.

Est spasmus artus successive extendens plures, vel omnes in oscitatione.

234 G. XIII. APOMYTTOSIS.

Est succussio cutis et capitis, cum trunci totius agitatione tremula et violenta; adest simul exspiratio sonora, quasi stertorosa.

235 G. XIV. CONVULSIO.

Est agitatio invita artus, vel musculi brevis cum superstite exercitio animi.

236 G. XV. TREMOR.

Artuum aut capitis alterna, per itus et reditus frequentes, motitatio per brevissima spatiola, cum movendi voluntate concurrens, qua cessante, cessat quoque tremor.

237 G. XVI. PALPITATIO.

Est pulsatio in regione cordis insolita, cum pulsu intermittente, crapizante, tremulo, subduro, inaequali, inordinato, debili, quandoque et dyspnoea ad quemlibet motum

notabili ; habeo aegram, cuius pulsus sub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem ; subin tremorem in praecordiis patitur, cum pulsu caprizante, tremulo ; notum est, quod regularis pulsatio cordis non dicatur palpitatio.

G. XVII. CLAUDICATIO.

238

Est vitiosus gradiendi modus, quo truncus singulis passibus huc vel illuc nimium inclinat, unde crus indecore movetur, trahitur.

O. IV. SPASMI CLONICI

GENERALES.

G. XVIII. PHRICASMUS.

239

Est succussio invita totius cutis, imo saepius totius corporis, frigorifera.

G. XIX. ECLAMPSIA.

240

Est morbus convulsivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum sensuum feriatione in paroxysmo ; pollices intro non

premunt, spuma ex ore non eru&tat, spasmi sunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus *apoplexia puerilis*.

241 G. XX. EPILEPSIA.

Est morbus spasmodicus clonicus, intermit-tens, seu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatione, dyspnoea, spumae oris eruptione, pugnorum constrictione, et sensuum feriatione exter-norum et internorum, sine asphyxia. *Symptomata*: Subitaneus casus, oblivio om-nium, clamor, mugitus, stridor dentium, truculentia oculorum, spuma oris, pugno-rum constrictio, totius corporis agitatio.

242 G. XXI. HYSTERIA.

Est artuum organorumque externorum inter-norumque spasmus clonicus tonicusve, pa-roxy&smis fugacibus, leviter variantibus, cum pusillanimitate, sensibilitate animae summa, mortis formidine intensa, teneritu-dine partium convulsarum remanente, attac-tum fugiente, et urina hyalina. Signa pa-thognomica hujus morbi statuit Ill. A-struc agitationem matricis, pnycem, con-

strictionem pectoris et glomum fluctuantem in abdomine.

G. XXII. S C E L O T Y R B E.

243

Est motus semivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in gressu, situ erecto, aut comedione, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem, referens; hunc morbum vocavit *Sydenhamus Chorea Sancti Viti.*

G. XXIII. B E R I B E R I A.

244

Est motus gradientium genua spastice retrahens, cum tremore artuum, formicationis sensu, vocis raucedine, stupore dolorifico artuum, qui morbis Indis est familiaris. In ovibus olim lupum videntibus beriberiam spasmodum vidi, stantes hae vel gradi- entes tristes momentanae retrahunt genua, ad situm naturalem illico redditura.

Q q

CLAS S I S VIII.

ANHELATIONES.

CHAR. CLASSIS. Est agitatio invita, defatigans muscularum pectoris, cum respiratione diffcili, laboriosa, sonora, frequenti, sine febre notabili, et sine phlegmasia.

O. I. ANHELATIONES
SPASMODICAE

Sunt symptomata fugacia spasmatica, saepius repetentia, quae consistunt in ex vel inspirationibus sonoris,

245 G. I. EPHIALTES.

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione et insomnio corporis cuiusdam pectus opprimentis; unde respiratio horum querula, gemebunda, et anxia.

245 G. II. STERNUTATIO.

Est violenta, sonora, et subitanea exspiratio, in nares posticas immisso aëre, ad nares everrendas sub convulsiva capitis et trunci corporis concussione, ad anteriora flex-

ione. Species sunt sternutacionis, *catarhalis*, *rubeolosa*, *verminosa*, *spontanea*, *fabricosa*, *epidemica*, *critica*, *medicamentosa*, &c.

G. III. OS C E D O.

247

Est aëris copiosi profunde inspirati diutina, lenta, et invita naturalis exspiratio, cum magno oris hiatu; saepe concurrit et pandiculatio.

G. IV. S I N G U L T U S.

248

Est concussio diaphragmatis invita, cum inspiratione subito interrupta, sonora.

G. V. T U S S I S.

249

Est concussio sonora, violenta, invita pectoris, cum exspiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

O. II. A N H E L A T I O N E S
S U P P R E S S I V Æ.

Hae fiunt cum metu suffocationis, suntque pleraeque constantes.

250 G. VI. STERTOR.

Est respiratio sonum gravem et tremulum in gutture edens, saepius sibilo stipata.

251 G. VII. DYSPNOEA.

Est difficultas respirandi assidua et chronica, sine signis empyematis, hydrothoracis.

252 G. VIII. ASTHMA.

Est chronica, periodica respirandi difficultas.

253 G. IX. ORTHOPNOEA.

Est morbus continuus acutus, subitanea anhelatione sublimi, et fere suffocatoria, stipatus.

254 G. X. PLEURODYNE.

Anhelatio, cum pectoris dolore, sine phlegmasia, cum exigua vel nulla febre.

255 G. XI. RHEUMA.

Cognoscitur ex difficultate respirandi, cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur coryza, sternutatio, raucedo, cephalalgia, tussis, sine pyrexia notabili, et sine sanguine inflammato; *endemius hic morbus.*

256 G. XII. HYDROTHORAX.

Est genus anhelationis chronicum continuum, stipatum phlegmasia pedum, pallore faciei,

oedemate manuum, subita in somno suffocatione, alterutrius manus stupore, sine signis empyematis; haec symptomata jam adsunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio crescit pro inclinatione corporis.

G. XIII. EMPYEMA.

257

Est difficultas respirandi a pectoris reclinazione crescens, quam praecessit phlegmasia pectoralis non resoluta, sed suppurata; comitur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis et in latus sanum difficilis, gravitas supra diaphragma, sudores profusi, rubor genarum, et multa symptomata hydrothoracis: Species sunt, *peripneumonicum, vomicale, pleurale, mediastinale, diaphragmaticum, intercostale*; quas species sufficiat hic nominasse, quum earundem historia nec dum satis provecta sit.

C L A S S I S IX. D E B I L I T A T E S.

CHAR. CLASSIS. Est impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, sensibus internis et externis utendi.

O. I. D Y S A E S T H E S I A E.

Impotentia clare et distincte sentiendi.

²⁵⁸ G. I. A M B LY O P I A.

Est visus debilitas respectiva ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellicidis; vel est debilitas visus absoluta, vel respectiva, sine opacitate cornea, aut via internarum partium oculi.

²⁵⁹ G. II. C A L I G O.

Est imminutio partialis, vel totalis deletio visus, propter repagulum opacum citra seu ante pupillam oculo inhaerens, aut palpebris.

G. III. CATARACTA.

260

Est visus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam, post pupillam positam, seu opacitatem lentis crystallinae.

G. IV. AMAUROSIS.

261

Est visus suppressio, abolitio, vel defectus, cum pupillae ferme plenaria immobilitate, sine sensibili oculorum vitio aut opacitate externis.

G. V. ANOSMIA.

262

Est imminuta, vel suppressa facultas percipiendi odores.

G. VI. AGHEUSTIA.

263

Est suppressio facultatis, qua diversos sapores percipimus, cum vel sine anorexia.

G. VII. DYSECOEA.

264

Est audiendi difficultas, seu gravis auditus et obscura perceptio sonorum.

G. VIII. PARACUSIS.

265

Est debilitas seu confusio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, sed non distincte diversos sonos et articulatas voces audiunt, vel alios sonos clare et distincte audiunt, alios tantum clare sine distinctione.

266 G. IX. COPHOSIS.

Est obscura, vel nulla sonorum perceptio, seu impotentia percipiendi sonos totalis, vel partialis.

267 G. X. ANÆSTHESIA.

Est sensus omnis privatio, superstribus motu musculari et rerum necessariarum appetitu aliquantum minutis, sine omni sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas, seu imminutio notabilis.

268 G. XI. ANOREXIA.

Est notabilis debilitas, imminutio, seu cessatio famis in jejunis animantibus.

269 G. XII. ADIPSIA:

Est si tis debilitas, seu imminutio, aut abolitio.

270 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Est debilitas, vel abolitio appetitus venerei, seu impotentia: Vide sterilitatem.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia exercendi motus solitos voluntati subjectos.

G. XIV. M U T I T A S.

271

Est impotentia proferendi voces articulatas.

G. XV. A P H O N I A.

272

Est plenaria vocis suppressio, citra stuporem,
syncopen, et comata; muti inarticulatam
vocem habent, aphoni contra nullam.

G. XVI. P S E L L I S M U S.

273

Est difficultas seu impotentia quasdam syllabas literasve recte pronunciandi, faciunt hoc puellae quaedam naviter, ut magis placeant procis.

G. XVII. C A C O P H O N I A.

274

Est vocis vitium et insuavitas atque asperitas.

G. XVIII. P A R A L Y S I S.

275

Est unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, absque dolore, cum vel sine anaesthesia; *paresis* est sensim invadens debilitas movendi artus, seu est imperfecta paralysis; movent enim hi artus, sed difficulter; colicam pectorum aliasque rachialgiae species conitatur, vel sequitur paresis, lente accedit paretica debilitas, et non est tanta, quanta observatur

paralyticorum; actu obseruo paroxysmum in
brachiis egregii chirurgi Christophori
Nohrer, ex colica pictonum laborantis.

276 G. XIX. HEMIPLLEGIA.

Cognoscitur ex summa debilitate, vel integrâ
motus muscularis suppressione unius late-
ris corporis, cum laxitate, frigiditate, indo-
lentia artuum et mentis integritate, sine
vel cum anaesthesia.

277 G. XX. PARAPLEXIA.

Est paralysis artuum inferiorum, vel omni-
um artuum, cum enuresi, anaphrodisia,
quandoque et anaesthesia ac marasmo.

O. IV. LEIPOPSYCHIAE.

Virium vitalium, pulsus, et respirationis debi-
litas seu imminutio; *pulsus est perpendicularis*
vitae.

278 G. XXI. ASTHENIA.

Est debilitas omnium artuum, superstite acti-
onum vitalium minutarum tenore, supersti-
tibusque sensibus, sine dolore.

G. XXII. LIPOTHYMI A.

279

Est subitanea et brevis virium muscularium et sensuum dejectio, seu eclipsatio, superstite pulsu et cognoscendi aliqua facultate adstantes, cum aurium tinnitus, calore, vertiginosaque capitis turba.

G. XXIII. S Y N C O P E.

280

Est subitanea virium omnium animalium, et vitalium sensuumve, imminutio tanta, ut aeger per tempus sui conscius non sit, cum lenta lenive respiratione, pulsu obscurro, sudore frigido, et aliquali interiorum calore.

G. XXIV. A S P H Y X I A.

281

Est subitanea eclipsis omnium actionum naturalium, animalium, et vitalium, cum mortis imagine : Vide Cl. *Lancisium* circa mortes subitaneas.

O. V. COMATA SEU MORBI
SOPOROSI.

Omnium sensuum feriationes, maximaе debilitates,

282 G. XXV. CATALEPSIS.

Est sensuum omnium motuumque muscularium suppressio, pulsu et respiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obscuris, cum mira ad quosvis situs suscipiendos et retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipsos prehendit morbus, et omnem recipiunt servantque, quam illis dederis; morbus est recurrens, et fors tantum mulierum.

283 G. XXVI. ECSTASIS.

Est status soporosus a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, aegrum in eodem situ, quo prehensus est, retinens, sine aptitudine cataleptica.

284 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Est sopor apprens, cum pervigilio delirioso reali, müssitatione; vel est sopor levis e quo aegri facile excitantur, cum delirio comitante.

285 G. XXVIII. LETHARGUS.

Est status soporosus facile excitabilis, cum summo imaginationis et memoriae torpore, oblivione, et febre.

G. XXIX. CATAPHORA.

286

Est somnolentia facile excitabilis, sine febre,
oblivione, stertore, delirio.

G. XXX. CARUS.

287

Est somnus altissimus, vix aut ne vix excitabilis, sine stertore, cum respiratione tacita pacatissima; morbus saepius est acutus; semi-apertis oculis plerumque dormiunt omnino immobiles.

G. XXXI. APOPLEXIA.

288

Est somnus profundissimus, vix aut ne vix excitabilis, cum stertorosa respiratione, faciei tumore, omnium artuum laxitate, et pulsu plerumque duro, forti.

C L A S S I S X. EXANTHEMATA.

C H A R . C L A S S I S . Febris cum asthenia, efflorescentia cutis maculata varia, pustulosa, papulosa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, saepius maligna.

O R D O I . E X A N T H E M A T A C O N T A G I O S A ,

289 G. I. P E S T I S .

Eruptio purpurae, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem pestis: Vide celebrem Loimographum *Diemerbroeckium*.

290 G. II. V A R I O L A .

Praeludium variolae patet fit cephalalgia, lumbagine, nausea, vomituritione, eclampsia, et febre continua inflammatoria; erumpunt dein pustulae phlegmonoideae suppurantes, escharoticae, deciduae, cicatrisantes; variola saepissime epidemicus mor-

bus habet IV. stadia, nempe contagium, eruptionem, seu inflammationem pustularum, suppurationem, tandem exsiccationem.

G. III. PEMPHIGUS.

291

Est phlegmasia saepius acuta, exanthematica, stipata bullis seu vesiculis avellanam circiter magnitudine aequantibus, sero flavo turgidis, per cutim sparsis: An *Hippocratis* T. I. p. 684. ichores constituerint pemphigum? Tomo citato, p. 798: *Hippocrates* scripsit: ‘πυετος οι δε πεμφιγωδεις.’ Et *Claudius Galenus*, sexto epidemiorum T. I. Classe 3. p. 311. Basilea 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admisit, quae est character hujus generis; nihil ergo novi pemphigus.

G. IV. PURPURA.

292

Sunt maculae pulicum morsibus similes, faciei parcentes, pressione non evanescentes, carentes stigmate aculei a pulice infixi, coloris purpurei, lateritii, nigri, lividi, sine tumore, aspredine, cum febre amphimerina, vel tritaeophya, putrida, asthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli,

293 G. V. RUBEOLA.

Post praeclodium catarrhosum, coryzam, epiphoram, tussim, cephalalgiam, somnolentiam, et palpebrarum tumorem, erumpunt papulae corymbosae rubrae, pulicis moribus aemulantes, asperae, uniformes, evanescenti-furfuraceae die IV. cum exiguo levamine symptomatum contagii in facie, collo, thorace, truncō reliquo, et artubus; quandoque sexto die in facie jam asperantur, siccantur, et in tenuissimum furfurem fatiscit epidermis; et hoc est initium tertii stadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comittatur rubeolam continua; rubeolam porro inoculat atmosphaera morbillosa bronchiis, sacco lacrymali, et sinibus sex in nares patentibus; medici contra seminatores rubeolae gossypium furfure morbilloso repletum sublimi vulnusculo, cuiusque brachii imponunt, emplastro omnia tegunt, et 6. die post appositum hunc apparatus incipiunt aegrotare.

G. VI. SCARLATINA.

294

Est efflorescentia maculosa, ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, diffusa, desquamabilis, sine praeludio catarrhali efflorescens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria scarlatinae observamus, praeludium noscimus inde, quod febris plerumque judicatoria, cum horrore et frigore, prehendat infantes, sub finem aestatis, sine praeludio catarrhali et sine vomitu; quanto vel citius die, facies intumescit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante descripta, et hoc est stadium secundum; post 3 vel 4 dies incipit stadium tertium, in quo evanescunt exanthemata, et epidermis sub forma subtilis pollinis desquamatur.

O. II. EXANTHEMATA
NON CONTAGIOSA.

G. VII. MILIARIS.

295

Eruptio phlycthaenarum milii semine raro majorum, cum sudore vapido; febris

S f

continua, vel remittens, putrida; praeludit oppressio praecordiorum, gastrodynia gravans, pulsus suppressus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, asthenia; persistant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c. diebus, et cum pruritu, sudore solvuntur, in farinam subtilem disparent. *Hippocrates*, T. I. p. 697. describit milarem et quidem criticam, seu servantem mulieres omnes, quarum cutim obsederat haec efflorescentia. *Silenus* insuper indubie 8. die morbi miliari rubra maculatus fuit, T. I. p. 674.

296 G. VIII. E R Y S I P E L A S.

Est eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, superficialis, dilatabilis, desquamabilis; fistit nimirum maculas latas, amplas, subtumidulas, non suppurabiles; sanguis missus crusta inflammatoria non est tectus, sed pelle alba, tenui, et sat tenaci; dolor erythematis est calens, rodens. Tria stadia observantur erysipelatis: *Primum* absolvit gravedo, horror, inappetentia, lassit-

tudo, cum febricula amphimérina; die 2. 3. vel 4. incipit secundum stadium, eruptio, nempe, erythematis, quod ordinario in 4. usque diem augetur; in tertio stadio collabatur successive tumor, calor, et dolor erythematris, et epidermis desquamatur, quod opus plerumque 4 diebus Natura absolvit.

G. IX. E S S E R A.

297

Constituunt hoc genus maculæ rubellæ impruriginosæ, non fastigiatae ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zæae, subito erumpentes ferme sine febre, et post 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies sponte et sine desquamatione epidermidis disparentes; quandoque sunt paucae, subin contra numero-sæ; aegri sunt plerumque orthostadii; praecedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, exstante effera, non est aspera ad attactum, nec rubedo est diffusa; maculae aliae sunt majores, aliae minores, sub epidermide latentes; hujus morbi meminit *D. Allen*, p. 407. ubi tamen non hunc, sed aliud descripsit; *Cl. D. Lieutaud*, T. I. p. 614. unam speciem descripsit hujus generis.

298 G. X. A P H T H A.

Cognoscitur aphtha papulis seu phlycthaenis linguac, faucium, oris superficiem occupantibus, subrotundis, plerumque semilinearibus, colore albis in disco, cum radio saepius rubro, vel rubris, brunneis, flavis, lividis, nigris, et febre tritaeophya, vel obscura hebetica, aut penitus nulla ; adeo simul somnolentia, dolor urens oris, et difficultas in masticatione, suctione, ac deglutitione. Aphtha 4 stadia habet distincte, si non omnibus speciebus, in febrili observabilia : Stadium *primum* sese prodit lassitudine spontanea, levi dyspnoea, gastrodynia, anxietate exigua, somnis turbatis, et calore oris : Stadium *secundum* propullatio papularum nobis adesse loquitur : In studio *tertio* elevantur papulae seu maculae in phlycthaenas miliares, quae probabiliter sunt idem cum miliaribus cutis : Stadium *quartum* absolvit desquamatio epidelii, cum dolore sensibilissimo linguae et faucium superficiali.

C L A S S I S X I.

P H L E G M A S I Æ.

CHAR. CLASSIS. Febris quasi semper continua, cum pulsu duro, dolore topico, aliquis partis inflammatione, sanguine crusta inflamatoria tecto, urina plus colorata, lingua subsicca, sicca, calente, &c. *Hippocrates*, T. 1. p. 810. 811. reliquit: Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoscimus.

O. I. P H L E G M A S I A E M U S C U L O S A E.

G. I. P H L E G M O N E.

Cognoscimus phlegmonem ex febre acuta continua inflammatoria, pulsu duro, sanguine crusta inflamatoria tecto, et partis externae inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet, rubet, dolet, tumet, est simul tensa resplendens sphaeroidea; cutis ipsa et partes sub ipsa contentae inflammatæ sunt; phlegmone in suppurationem tendit, neutiquam vero erysipelas.

330 SYSTEMA MORBORUM

300 G. II. CYNANCHE.

Est phlegmasia acuta pharyngis, laryngis, dyspnœam et dysphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quae adesse docet inspectio in fauces, depressa lingua.

301 G. III. M Y O S I T I S.

Febris acuta inflammatoria, dolores in diversis musculis artuum, eorundemque involucris, diu noctuque discruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes ; sanguis missus est tectus crusta inflammatoria subgelatinosa, vel pelle tenui tenaci ; hic morbus vulgo audit rheumatismus acutus.

302 G. IV. C A R D I T I S.

Adest dolor constans sub sterno in regione cordis urens,flammam vitae extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulsu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inaequali, inordinato, intermittente ; febre acuta typhode et anxietatibus ; cor manu tenentes aegri fugitivis oculis et mille jaestationibus agitati, sibi comburi, illudque mori quaeruntur, clamant.

O. II. PHLEGMASIÆ
MEMBRANACEÆ.

G. V. PHRENITIS.

303

Est phlegmasia acuta, cum pyrexia et delirio
perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque
incipiens; delirium quandoque est audax,
urina plerumque citrina, cum nebula sub-
limi.

G. VI. DIAPHRAGMITIS.

304

Est phlegmasia cum dolore obscuro ad costas
spurias, oppressione pectoris, sputis saepe
cruentis, orthopnoea, anxietate; cingulum
praecordia stringens quaeruntur aegri; an-
gulos oris semivoluntarie saepe retrahen-
tes delirant; quandoque lethargo, vel ca-
taphora laborant; pulsus est inaequalis, in-
ordinatus, intermittens, durus; hypochon-
dria intro tracta, respiratio sine motu dia-
phragmatis; facies jam pallet, jam rubet;
calor est urens ad praecordia internus;
scripsi sicut observavi in meis aegris: Vi-
de *Hippocratem*, T. II. p. 101. IX.

G. VII. PLEURITIS.

305

Est phlegmasia cum pyrexia acuta, dysp-

noea, dolore pectoris plerumque punctorio, et tussi molesta dolorem augente, sine gravitate in medio pectore; sedes morbi in 300 pleuriticis denatis a *P. Servio Romano* in pleura pulmonali inventa est; invenit, nimirum, pleuram pulmonis superficiem investientem, cum superficialibus et extremis vasis pulmonis, inflamatam.

306 G. VIII. GASTRITIS.

Est phlegmasia stipata dolore epigastrii, ardore, tensione, siti, nausea, vomitione, sanguitu, et pyrexia acutissima.

307 G. IX. ENTERITIS.

Est phlegmasia acuta, cuius symptomata sunt tensio tumida et valde dolorifica, tactum non tolerans, partium abdominis intestinis respondentium, cum pyrexia, meteorismo, quandoque et ileo, vel dysenteria.

308 G. X. EPIPLOITIS.

Bis observavi hanc phlegmasiam, semel in viro rustico 30 annorum, et semel in quadagenaria muliere, cum sequente charactere: Febris erat mitis amphimerina, virium non adeo magna prostratio (rusticus venerat ipsius 4ta die morbi pro consilio

ad me) lingua alba tumidula, sanguis mis-
sus coriaceus, obstipatio non pertinax, do-
lor obtusus infra peritonaeum ad tactum
paululum acutus, tumor omenti, respira-
tio suspiriosa, pulsus durus naturali celeri-
tate et frequentia non multum major, sitis
mediocris, urinae flavae, appetitus aliquis,
aliquis et somnus.

G. XI. C Y S T I T I S.

309

Est phlegmasia, cujus praecipua symptoma-
ta sunt intumentia ovalis in pelvi, cum
tensione, dolore tactum non tolerante, dy-
suria, vel ischuria et pyrexia amphimeri-
na; adsunt insuper vigiliae, sitis, subin de-
lirium, extremorum frigus, tenesmus, vel
obstipatio; pulsum observavi tensum, sub-
durum, naturali frequentia et celeritate
non multum majorem; in sanguine missa
crustam tenuem albam, subgelatinosam,
clysmatum difficultem injectionem: Scri-
bo sicut observavi.

O. III. P H L E G M A S I A E
P A R E N C H Y M A T O S A E.

G. XII. C E P H A L I T I S.

310

Est phlegmasia, in qua mentis stupor, som-
T t

nolentia, sopor cataphoricus, carphologia adsunt, cum pyrexia acuta typhode; pulsus successive mollescit, cum frequentia fine celeritate; aegri sunt admodum debiles; lingua plerumque mollis, sudor quasi perpetuus; caput saepe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Ter observavi jam hunc morbum, et post mortem in cuiuslibet aegri cadavere suppurationem cerebri inveni; respirabant hi aegroti cum sonitu sine stertore.

311 G. XIII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, sensus oppressionis gravitative sub sterno, calor et anxietas in pectore, tussis cruenta, facies rubra, lingua rubra tumidula; pulsus in incremento magnus, sub inspiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

312 G. XIV. HEPATITIS.

Est phlegmasia acuta, cuius symptomata sunt tensio dolorifica hypochondrii dextri sub costis spuriis, cum sensu ardoris ac gravitatis, dyspnoea, tussi sicca, faciei colore fla-

vescente, siti, anorexia, saepius et singulu-
tu, vomitione et tumore hepatis ; pulsus est
subdurus, tensus ; urinae icteritiae, bilio-
sae ; serum sanguinis missi et crusta sub-
flava ; febris quasi semper remittens.

G. XV. SPLENITIS.

313

Cognoscitur haec phlegmasia febre remit-
tente, saepius tetartophya, tumore, du-
ritie in regione lienis, dolore tactum
fugiente pulsatili, calore, dyspnoea, pul-
su in inspiratione intermittente in carpo
sinistro magis, et absentia symptomatum
nephriticorum ; frigent hi aegri artibus ;
calor internus non est adeo magnus ; san-
guis missus est crusta inflammatoria tec-
tus ; cibi adest fastidium, decubitus in la-
tus sinistrum difficilis, sitis et anxietas :
Semel observavi hunc morbum sicut illum
hic descripsi.

G. XVI. NEPHRITIS.

314

Est phlegmasia pyrexia acuta, dolore renum
inflammatorio, urinae ardore, mictione
frequenti stipata ; dolor sequitur ureteres,
testis retrahitur, rotatur, crus stupet, ple-

rumque adeſt vomitio, ſine augmento doloris aeger poterit corpus ad anteriora flexum erigere.

315 G. XVII. METRITIS.

Hanc phlegmasiam adeffe noſcimus tumore, ardore, dolore, gravitate in regione uteri, et pyrexia acuta; digiti in vaginam immifſi os uteri tactum non fert, idem valde calet; adeſt dolor ad inguina, femora, diaphragma, qui ad claviculas extenditur, cum dyspnoea, nauſea, vomitione, ſingultu, obſtipatione, iſchuria, vel dysuria, horrore perpetuo, frigore extreſorum, delirio, jactatione, ſpasmis, dolore oculorum; pulſus varius, animi deliquia, ſopor, tetanus, catalepsis obſervantur, cum febre plerumque remittente.

C L A S S I S XII.

F E B R E S.

CHAR. CLASSIS. Pulsus frequens, celer, fortis ; respiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis ; vel virium vitalium augmentum, aut saltem in statu sanitatis perseveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

O. I. FEBRES CONTINUÆ.

Pyrexia semel crescit, et semel decrescit, in decursu aegritudinis.

G. I. JUDICATORIA.

316

Ingruit tota febris subito cum frigore, calore, capitis dolore, &c. pulsu aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum sunt minutae, vires contra vitales multum auctae, criticae; absolvitur 4 diebus.

G. II. HUMORARIA.

317

Cognoscitur haec febris pulsu irritationis, incremento successivo usque IV. V. VII. vel IX diem, duratione morbi usque VII. IX.

338 SYSTEMA MORBORUM

XI. vel XIV. diem, notabili debilitate artuum, vehementibus symptomatibus, et humorum augmento, aut vitio, unde noscitur.

318 G. III. FRIGERARIA.

Est febris continuae genus, quae decurrit ad XVII. XXI. vel XXX. diem, incrementum habet longius praecedente; ingruit cum pulsu irritationis; pulsu et respiracione auctis, viribus artuum multum minutis; notabili frigore saepe et rigore, unde *Frigeraria*; lingua est sordida, excreta omnia foetida, a statu naturali multum distantia; haec est febris proprie *putrida*.

319 G. IV. TYPHUS.

Est febris continuae genus, quae plerumque ultra tres septimanas durat, cum calore jam magno, jam nullo, urina et pulsu sanorum similibus, artuum summa debilitate; pulsus quandoque rarer est quam pulsus sanus, color cutis pallidus, squalidus, exanthemata varia huic morbo superveniunt epigenomena.

G. V. HECTICA.

320

Est febris continua, quae chronicorum morborum more sensim extendi suevit per plures septimanas, imo menses, sine notabili virium prostratione, cum exigua pulsus frequentia; urina saepius est turbida, pelliculam innatantem pingue gerit; pulsus est subdurus, post pastum frequentior, calor ad attackum est mordens; sudores nocturni; febris haec, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthisi, et tabe, quia suppurationem pro causa non habet; aegri sunt plerumque orthostadii.

O. II. FEBRES REMITTENTES.

Sunt febres continuae cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c

G. VI. AMPHIMERINA.

321

Est febris continua, cum exacerbationibus quotidianis sibi similibus.

G. VII. TRITÆOPHYA.

322

Est febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

323 G. VIII. TETARTOPHYA.

Est febris continua, cum exacerbationibus quartanis, seu quartanae typum servantibus.

O. III. FEBRES INTERMITTENTES

Pyrexia in decursu aegritudinis pluries penitus deserit aegrum, et reddit cum intervallis mediis lucidis servata periodo.

324 G. IX. QUOTIDIANA.

Febris intermittens, cuius paroxysmi similes redeunt nycthemeris singulis.

325 G. X. TERTIANA:

Est febris intermittens, cuius paroxysmi alternis diebus sibi similes repetunt, seu circuitum servant; urinae lateritiae sunt optimum signum febrium intermittentium.

326 G. XI. QUARTANA.

Est febris intermittens, cuius paroxysmi sibi similes quarta quavis die abeunt, et revertuntur; inter quoslibet duos paroxysmos intercedunt duae dies apyretae.

G. XII. ERRATICA.

327

Haec febris distinguitur ab aliis generibus per accessus similes pluribus diebus ab invicem distantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri potest.

U u

C L A S S I S X I I I .
V E S A N I Æ.

CHAR. CLASSIS. Morbus mentis, seu error
in imaginatione, appetitu, judicio, vel me-
moria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Imaginationes deceptivae ex errore organi,
vel mentis natae.

328 G. I. VERTIGO.

Est hallucinatio, qua objecta, licet quiescentia,
e loco moveri, nutare, vel in gyrum ver-
fari, nobis videntur, ipseque aeger quan-
doque sibi nutare videtur ; dicta phaeno-
mena etiam clausis oculis plerique patiun-
tur.

329 G. II. SUFFUSIO.

Est genus morbi imaginarii, cuius praeci-
puum symptomæ est hallucinatio visus cir-

ca objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non existit; suffusio repreäsentat corpora quae non sunt, et vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

G. III. DIPLOPIA.

330

Est hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur sibi videre.

G. IV. SYRIGMUS.

331

Est error imaginationis sonos, qui extra aurem non sunt, sibi repreäsentantis, a commotione vibratoria organorum acousticorum per principia in aure latentia natos.

G. V. HYPOCHONDRIASIS.

332

Est delirium circa propriam valetudinem, natum ex philautia, salvo ratiocinio de reliquis, delirant et desperant de sua valetudine recuperanda ob ructus, borborygmos, palpitationes, tremorem praecordiorum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi persuasi fatum lethale sibi imminere, omnia symptomata et minimas mutationes

344 SYSTEMA MORBORUM

in corpore suo scrupolose observant, narrant, et describunt medicis, suisque querulis, alios mox et alios defatigant, ingenio caeterum et appetitu pollentes.

333 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Est dormientium hallucinatio, somniantes, nempe, ob imaginationem vividissimam, sopitis somno sensibus, motus musculares exercent, surgunt e lecto, variis periculis se exponunt, tecta scandunt, iter sucipiunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel aversationes depravatae.

334 G. VII. PICA.

Est alimentorum inassuetorum, vel rerum indigestibilium, appetitus, cum assuetorum aversatione.

335 G. VIII. BULIMIA.

Est appetitus majoris alimentorum digestibilium et solitorum copiae, quam quae a vi-ribus ventriculi digeri potest.

G. IX. POLYDIPSIA. 336

Est potulentorum appetitus immodicus.

G. X. ANTIPATHIA. 337

Est aversatio quorundam objectorum tanta,
quod homo ex eorum visu, odoratu, audi-
tu, &c. gravia symptomata patiatur.

G. XI. NOSTALGIA. 338

Est desiderium videndi parentes, cognatos, so-
lumque natale adeundi adeo ardens, ut
hac sola anhelatione occupati penitus lan-
guant; horumque animae commercium
cum corpore ferme sublatum sit; unde
languent omnes sensus, et appetitus alii;
hectica febris hos miseros consumit, et ad
lethum dicit, si adeundi patriam cognata-
tos copia denegetur; olim in Croatia Cri-
sii laboravi hoc malo cum apositia, et ob-
stipatione, intumueram ex anasarca pervi-
gil et debilis; redux ad patriam sine om-
ni pharmaco convalui; desideramus varia
ardentissime.

G. XII. PANOPHOBIA. 339

Est summus pavor inter dormiendum sine
causa evidenti ortus; clamant hi, gemunt,

346 SYSTEMA MORBORUM

tremunt, sudant; hoc genus non multum differt ab ephialte.

340 G. XIII. SATYRIASIS.

Est morbus proprius viris, cuius praecipuum symptoma est effraenis impudensque veneris cupiditas, cum libidinosa penis tentigine; priapismus caret cupiditate libidinosa.

341 G. XIV. NYMPHOMANIA.

Hujus generis character est effraene, audax, et impudens in foeminis veneris desiderium.

342 G. XV. TARANTISMUS.

Hic morbus scribitur in Apulia esse endemicus, cuius praecipuum symptoma est inexplicabilis saltandi, choreas agendi cupiditas; a tarantulae morbu excitari hunc morbum judicat Baglivius, quod Ill. Serao et experimenta Romana inficiantur.

343 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Est morbus, cuius praecipuum symptoma est incredibilis potulentorum omnium aversa-

tio, impossibilis deglutitio; vitant insuper lucem et aëris motum.

G. XVII. R A B I E S.

344

Est morbus in lupis et canibus observatus, cuius praecipuum symptoma est effraenans cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, sine hydrophobia; constat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes luposque rabidos bibisse, manducasse, et flumen tranasse; hic nihilominus morbus saepius est symptoma hydrophobiae: Vide dissertationem Ill. de *Sauvages de Rabie*. Rabies porro datur *canina*, *maniaca*, et *daemonomaniaca*: Vide *Hydrophobiam*.

O. III. D E L I R I A.

Delirium est ortus idearum non respondens objectis in sensus incidentibus, sed internae cerebri dispositioni a qua nascuntur ideae delirantium.

G. XVIII. P A R A P H R O S Y N E.

345

Est delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cuius comes et symptoma est.

346 G. XIX. AMENTIA.

Est insania chronica, universalis, mitis, seu ineptitudo ad recte ratiocinandum et judicandum, cum sensu et perceptione objectorum, ast sine attentione.

347 G. XX. MELANCHOLIA.

Est insania chronica partialis, moesta, meditabunda; delirant melancholici sine furore, et sine febre, de uno potissimum objecto constanter, delirant circa semetipsos, aut suum statum, de reliquis objectis adhuc sat bene ratiocinantes; mihi videtur causa hujus morbi latere in abdomine, ganglia semilunaria afficere, et plexus nervorum abdominales.

348 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Est delirium sine febre reipsa tale, vel tantum simulatum, quo magi, sagae, praestigiatores se tanquam a daemone obsecros ostentant, varia phaenomena leges naturales excedentia praestare, exhibere volunt.

349 G. XXII. MANIA.

Est delirium apyretum circa quaevis objecta, cum furore, audacia, ac robore; maniaci

habent plerique lucida intervalla; subin est mania periodica; unde Lunatici; sanguis maniacorum viscidus, feroque carens, fibrae musculares rigidae.

O. IV. VESANIAE ANOMALAE.

Morbi prioribus affines.

G. XXIII. AMNESIA.


349

Est memoriae imminutio aut plenaria abolitionis.

G. XXIV. AGYPNIA.

350

Pervigilium immodicum vel continuum, ex quo vires imminuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque molestia symptomata, oriuntur.





THE LIBRARY
OF THE
ESSEX INSTITUTE

2. 2.

PRESENTED BY

Received _____

